

隨息居重訂霍亂論四卷

清 王士雄撰

上海圖書館藏清同治二年上海崇本堂刻本

隨息居重訂霍

亂論

嘉興徐崇富題



同治二年四月
上海密本堂陳藏版

經云人之傷於寒也則為病熱蓋六氣之邪都從火化外感之病雖有因寒因熱之分而熱者較多霍亂不過外感之一證其中亦有寒有熱初非專屬於寒也特以其來太驟擬議不及辨證稍疏生死立判視傷寒溫暑尤難措手昧者乃專執附桂一方統治一切霍亂不亦傾乎夢隱向有霍亂論之刻久已風行近又重加編訂益為詳備蓋深疾偏執一方以治百病之弊故不辭痛切言之如此讀者願疑其偏用寒涼未免以詞害意矣昔洄溪作慎疾芻言而自論之曰有疑我為專用寒涼攻伐者不知此乃為誤用溫補者戒非謂溫補概不可用也諒哉斯言請以移贈夢隱此書可乎同治癸亥正月烏程汪曰楨

霍亂急證也而古無專書開或及之亦語焉未詳故臨證者苦無成法可遵海昌王夢隱先生屢遊玉環嘗著專論以壽世定州楊素園大尹重刻於西江謂其理明辭達指陳病機若黑白之不可混淆顧海內多故板之存否杳不可知壬戌夏此間霍亂盛行求先生書不易得適先生避亂來游惻然傷之慨將原稿重爲校訂諸加暢法加詳類證咸備寓意持深讀此書者苟能隅反不但爲霍亂之專書也因請於先生亟付剞劂以質病瘼在抱之君子

同治二年夏五月鎮海陳亨謹跋於上海崇本堂

隨息居重訂霍亂論總目

病情第一

總數

熱證

寒證

治法第二

伐毛

取嚏

刮法

焯法

刺法

搗洗

治熱證

熨灸

治寒證

偵探

策應

紀律

守險

醫案第三

南鍼

夢影



藥方第四

藥性
方劑

隨息居重訂霍亂論第一病情篇

海昌王士雄夢隱集

鎮海陳亨春泉校

隨息居士當昇平盛世。生長杭垣。不幸幼失怙。自知無應世才。而以潛名其齋。或謂甘自廢棄。而以癡目之。因自號半癡山人。嘗刊潛齋醫學叢書十種問世。年未五十。忽挈兩弟。攜一硯以歸。籍然貧無錐地。賃屋而居。或問故曰。余繼先人志耳。乃顏其草堂曰歸硯。輯歸硯錄以見志。藉硯遊吳越間。哺其家口。泊庚申之變。或招遊。而越辭不往。辛酉秋。勢日蹙。不克守先人邱壟。始別其兩弟。攜妻孥。棲于濮院。人視之如野鶴閒雲。而自傷孤

霍亂病情

露四十年。值此亂離。靡定題所居曰隨息。且更字夢隱。草隨息居飲食譜以寓感慨。迫季冬。杭垣再陷。悠悠長夜。益覺難堪。今春急將三四兩女。草草遣嫁。夏間避地申江。妻孥踵至。僦屋黃歇浦西。仍曰隨息居。略識顛末。俾展卷而知隨處以息者。即半癡山人。身不能潛硯。無所歸之華胥小隱也。

重訂霍亂論者。以道光間。嘗草霍亂論于天台道上。為海豐張柳吟先生閱定。同郡王君仲安梓以行世。蓋二十餘年矣。板存杭會諒化劫。灰燼豐初元。定州楊素閣先生。又與王氏醫案十卷合刻于江西。不知其板尚存否。今避亂來上海。適霍亂大行。司命者罔知所措。死者實多元和金君靈齋仁心。為質惻然傷

之偏搜坊間霍亂論欲以弭亂而不能多得聞余踪跡即來訂交始知其讀余書有年神交已久屬余重訂以為登高之呼余自揣無撥亂才方悔少年妄作之非愧無以應也踰兩月蓋齊亦以此證還述尤愴余懷哲嗣念慈檢得轉筋證治遺書一冊示余曰此先人丁巳年刊于姑蘇者今板已燬書亦無餘余讀之簡明切當多采芻蕘洵可傳之作因歎蓋齊稱晦之深竟不余告也吳縣華君麗雲知余硯田蕪穢持家藏下巖青花石一片見贈曰子將無意慰金君耶有意慰金君則重訂之舉曷可以已乎余不能辭遂受其片石纂此以慰蓋齊于地下非敢自忘不武謂可以戡定斯亂也書成題曰重訂霍亂論首病情次治法次醫案次藥方凡四篇同治建元壬戌閏月丙午華胥小隱自記

總義

素問六元正紀大論曰太陰所至為中滿霍亂吐下太陰溼土之氣內應于脾中滿霍亂吐下多中焦溼邪為病故太陰所至不必泥定司天在泉而論也五運分步春分後交二運火旺天乃漸熱芒種後交三運土旺地乃漸溼溼熱之氣上騰烈日之暑下燦人在氣交之中受其蒸淫邪由口鼻皮毛而入留而不去則成溫熱暑疫諸病霍亂特其一證也若其中陽素餒土不勝溼或飲冷貪涼太過則溼遂從

寒化而成霍亂者亦有之然熱化者天運之自然寒化者體氣之或爾知常知變庶可治無不當也靈樞經脈篇曰足太陰脈氣上逆則霍亂

足太陰脾土臟也其應在溼其性喜燥鎮中樞而主升降濁之司惟溼盛而滯其升降之機則濁反厥逆于上清反抑陷于下而為霍亂雖有熱化寒化之分治宜宣其濁則逆自平而亂乃定清自升也

傷寒論曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

此設為問答以明霍亂之病謂邪在上者多吐邪在下者多利邪在中焦上逆而為嘔吐復下注而利者則為霍亂霍亂

者揮霍悶亂成于頃刻變動不安之謂也若上不能納下不能禁之久病但名吐利不得謂之霍亂也

又曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也

徐洄溪曰此霍亂是傷寒變證郭白雲曰此論霍亂似傷寒之證蓋傷寒而霍亂者陰陽二氣亂于胸中也初無病而霍亂者往往飲食失節而致胸中逆亂也經云清氣在陰濁氣在陽營氣順脈衛氣逆行清濁相干亂于胸中是為大悅亂于腸胃則為霍亂惟亂于胸所以吐亂于腸所以利經言五亂霍亂其一也張路玉曰傷寒吐利由邪氣所傷霍亂吐利

由飲食所傷其有兼傷寒之邪。內外不和。加之頭痛發熱。而吐利者是傷寒霍亂也。雖按霍亂有因飲食所傷者。有因溼邪內蘊者。有因氣鬱不舒者。但既有發熱頭痛身疼惡寒之表證。則治法必當兼理其表。此仲聖主五苓散之義也。然表證之可兼者。不獨寒也。如吸受溫熱風暑之邪者。皆能兼見表證。舉隅三反。活法在人。其溫暑直侵脾胃。與內邪相協為虐。迨裏氣和而吐利止。則邪復還之表而為發熱者。駕輕湯主之。寒霍亂後表不解者。有仲聖之桂枝法在。

醫微曰。霍亂之候。其來暴疾。腹中疴痛。擾亂不安。有吐瀉交作。有吐而不瀉。瀉而不吐。有不得吐而又不瀉。則邪有上下淺

霍亂病情

四

深之分。而總以得吐為愈。邪有入必有出。鹽湯探吐。上妙法門。然後調其胃氣可也。蓋霍亂每傷于胃。雖風寒暑溼。四氣相乘。而中必先虛。故邪入焉。至飲食失和。穢邪觸感者尤多。胃氣一傷。清濁相干。邪不去則正不安。所以攻邪尤要于扶正也。即至肢冷脈伏。轉筋聲啞。亦必驅邪至盡。蓋邪去則正安。非比他證。養正而邪自除也。所以當其發時。不可用米飲。先哲諄諄戒之。豈無謂哉。觀于乾霍亂。上不得吐。下不得瀉。亦因邪不能出。所以為劇治者。益可思其故矣。

此治霍亂之大法也。總以得吐為邪有出路者。承上不得吐瀉之乾霍亂言也。邪不去則正不安。尤為治諸病之名言。但

霍亂雖無養正則邪自除之理。而虛多邪少之證。亦間有之。治宜懷外安中。並用又未嘗無其法也。

病源曰。霍亂脈大可治。微細不可治。霍亂吐下脈微遲。氣息少。口不欲言者不可治。

治法彙曰。吐瀉脈代。乃是順候。氣口脈絃滑。乃膈間有宿食。雖吐猶當以鹽湯鵠翎探之。吐盡用和中藥。凡吐瀉脈見結促代。或隱伏。或洪大。皆不可斷以為死。果脈來微細欲絕。少氣不語。舌卷囊縮者。方為不治。

醫通曰。脈伏或微遲者。霍亂脈長為陽明本病。霍亂脈洪大。皆虛微遲細兼喘者。乃霍亂之後。陽氣已脫。或遺溺不知。或氣怯

霍亂病情

五

不語。或膏汗如珠。或躁欲入水。或四肢不收。舌卷囊縮。皆為死候。

金鑑齋轉筋證治云。此證重者立時脈伏。乃邪閉而氣道不宣。勿輕信庸工為脈絕不救也。按營虛氣奪。脈微欲絕者。復脈湯主之。氣散陽飛。脈微欲絕者。四逆湯主之。若客邪深入。氣機痺塞。脈道不能流通。而按之不見者。為伏脈。此為實證。與絕脈判若天淵。苟遇伏脈。而不亟從宣通開泄之治。則脈亦伏而漸絕矣。但此乃邪閉之絕。彼為元脫之絕。脫者誤開陽亡而死。閉者誤補邪固而死。又按天士云。經曰。暴病暴死。皆屬于火。火鬱于內。不能外達。故似寒證。關竅閉塞。經絡不

通脈道不行多見沉滯無火之脈愚謂各證皆然舉一可例其餘然非閱歷深者不能知此

熱證

素問六元正紀大論曰土鬱之發爲嘔吐霍亂

諸鬱之發必從熱化土鬱者中焦滯盛而升降之機乃窒其發也每因吸受暑穢或飲食停滯遂至清濁相干亂成頃刻而爲上吐下瀉治法如煎照湯宜土鬱而分陰陽連朴以祛暑穢而行食滯若驟傷飽食而脘脹脈滑或脈來澀數模糊胸口按之則痛者雖吐猶當以鹽湯探吐吐盡其食然後以駕輕致和等湯調之

霍亂病情

六

又云不遠熱則熱至熱至則身熱吐下霍亂

此明指霍亂有因熱而成者奈病源三因等書咸謂霍亂本于風冷遂致後人印定眼目凡患熱霍亂者率爲藥誤且不遠熱三字亦非但以藥食爲言如勞役下長途田野之間則暑邪自外而入所謂熱地如鎗傷人最速宜白虎湯六一散之類甘寒以清之或安享乎醇酒膏粱之奉則溼熱自內而生所謂厚味脂膏不節則嗟宜梔鼓湯連朴飲之類苦辛以泄之其有暑入傷元白虎湯可以加參氣虛招感用參朮必佐清邪昔賢成法自可比例而施奈昧者妄謂勞傷之病宜補膏粱之體必虛知其一不知其二信手溫補動輒殘生可

哀也已

至真要大論曰諸熱皆瘧諸逆衝上諸躁狂越皆屬于火督昏悶也瘧抽掣也熱傷神則驚火迫血則慄火性炎上故逆而衝上躁煩躁不安也狂狂亂也越失常度也熱盛于外則肢體躁擾熱盛于內則神志煩亂蓋火主動凡病之動者皆屬于火霍亂而見此等證候者皆爲熱邪內盛之的據也又曰諸轉反戾水液渾濁諸嘔吐酸暴注下迫皆屬于熱諸轉反戾轉筋拘攣也熱氣燥燥于筋則攣爲痛火主燔灼躁動故也水液小便也小便渾濁者天氣熱水渾濁也嘔吐者火氣炎上之象也胃爲陽土性主下行胃中熱盛則迫

霍亂病情

七

逆而上衝也土爰稼穡而味變酸者肝熱內燔故從而化也暴注卒暴注泄也腸胃熱盛而傳化失常火性疾速故如是也下迫後重裏急迫痛也火性急速而能燥物故也此段經文形容霍亂轉筋證象如繪業醫者必人人讀之何以臨證茫然徒載于弔腳痧腳麻沙等俗名而貿貿然妄投燥熱之藥以促人天年抑何不思之甚耶

千金要方曰中熱霍亂暴利心煩脈數欲得冷水者以新汲井水頓服一升

郭白雲曰治霍亂之法惟千金要方最爲詳備

治暑全書曰暑氣入腹惡心腹痛上吐下瀉瀉如水注

春分以後。秋分以前。少陽相火。少陰君火。太陰溼土。三氣合
行其政。故天之熱氣下。地之溼氣上。人在氣交之中。受其蒸
淫之氣。由口鼻入而擾其中。遂致升降失司。清濁不分。所瀉
者。皆五臟之津液。急宜止之。然止非通。因塞用之謂也。溼甚
者。胃苓湯分利陰陽。暑亦自去。熱甚者。桂苓甘露飲清其暑。
火溼亦潛消。若火盛之體。內本無溼。而但吸暑邪者。白虎湯
之類宜之。且臟性有陰陽之別。陰虛者火旺。雖病發之時。適
犯生冷。而橘朴等只宜暫用。陽虛者溼勝。雖寒潤之品。非其
所宜。如胃苓湯已為合法。縱使體極虛羸。亦不過補氣清邪。
竝用。若因其素稟之虧。而忘其現病之暑。進以丁附薑桂之

霍亂病情

入

劑。真殺人不轉睫矣。凡傷暑霍亂。有身熱煩渴。氣粗喘悶。而
兼厥逆躁擾者。慎勿認為陰證。但察其小便必黃赤。舌苔必
黏膩。或白厚。宜燃照湯澄冷服一劑。即現熱象。彼時若投薑
附藥。轉見渾身青紫而死矣。甚或手足厥冷。少氣。脣面爪甲
皆青。腹痛自汗。六脈皆伏。而察其吐出酸穢。瀉下臭惡。小溲
黃赤熱短。或吐下皆係清水。而瀉出如火。小溲點滴。或全無
者。皆是熱伏厥陰也。熱極似陰。急作地漿煎。竹葉石膏湯服
之。又有吐瀉後身冷如冰。脈沉欲絕。湯藥不下。或發噦。亦是
熱伏于內。醫不能察。投藥稍溫。愈服愈吐。驗其口渴。以涼水
與之。即止。後以駕輕湯之類投之。脈漸出者生。然暑之為病。

傷之驟則發之暴。傷之漸則發之緩。故九月時候。猶多伏暑。
霍亂之證。醫者不可不知。
金匱曰。轉筋之為病。其人臂腳直。脈上下行微絛。轉筋入腹者。
雞矢白散主之。

劉守真曰。轉反戾也。熱燥于筋。則攣瘕而痛。或以為寒。客于
筋者。誤也。蓋寒主收引。然止為厥逆。禁固屈伸不利。安得為
轉也。所謂轉者。動也。陽動陰靜。熱證明矣。夫轉筋者。多由熱
甚。霍亂吐利所致。以脾胃土衰。則肝木自盛。而熱燥于筋。故
轉筋也。夫發渴則為熱。凡霍亂轉筋而不渴者。未之有也。
尤拙吾曰。肝主筋。上應風木。肝病生風。則為轉筋。其人臂腳

霍亂病情

九

直脈上下行微絛。經云。諸暴強直。皆屬于風也。轉筋入腹者。
脾土虛而肝木乘之也。雞為木畜。其矢微寒。而能祛風溼。以
利脾氣。故取以治是病焉。
張石頑曰。嘔吐泄瀉者。溼土之變也。轉筋者。風木之變也。溼
土為風木所剋。則為霍亂轉筋。平胃散加木瓜主之。有一毫
口渴。即是伏熱。凡尤附薑桂種種燥熱之藥。誤服即死。雖五
苓散之桂。亦宜慎川。按張氏此言。可謂先獲我心矣。蓋仲
聖雖立熱多欲飲水者。五苓散主之之法。然上文有頭痛惡
寒之表證。仍是傷寒之霍亂。故用兩解之法。其雖兼表證。而
非風寒之邪。或本無表證。而熱甚口渴者。豈可拘泥成法。不

知變通而徒藉聖人爲口實哉。透諸古人法之意是眞讀書人語定州楊照素著
薛一瓢曰。風自火生。火隨風轉。乘入陽明則嘔。厥及太陰則瀉。是名霍亂。竄入筋中則攣急。流入脈絡則反張。是名瘧。故余曰。瘧與霍亂同出一源。但瘧證多厥。霍亂少厥。蓋瘧證風火閉鬱。鬱則邪勢愈橫。不免逼亂神明。故多厥。霍亂風火外泄。泄則邪勢外宣。不至循經而走。故少厥。此瘧與霍亂之分別也。然瘧證邪滯三焦。三焦乃火化。風得火而愈扇。則逼入膈中而暴厥。霍亂邪走脾胃。脾胃乃溼化。邪由溼而停滯。則注及諸經而拘攣。火鬱則厥。火竄則攣。又瘧與厥之遺禍也。瘧之攣急。乃溼熱生風。霍亂之轉筋。乃風來勝溼。土也。瘧則

霍亂病機

十

由經及臟而厥。霍亂則由臟及經而攣。總由溼熱與風清亂清濁升降失常之故。夫溼多熱少。則風入土中。而霍亂熱多溼少。則風乘三焦而瘧厥。厥而不返者死。胃液乾枯。火邪盤踞也。轉筋入腹者死。胃液內潤。風邪獨勁也。然則胃中津液所關。顧不鉅哉。厥證用辛開泄。胸中無形之邪也。乾霍亂用探吐。泄胃中有形之滯也。然泄邪而胃液不上升者。熱邪益熾。探吐而胃液不四布者。風邪更張。終成死候。不可不知。雄按霍亂溼多熱少。道其常也。至于轉筋。已風自火出。而有勝溼奪津之勢矣。余自髫年卽見此證流行。死亡接踵。嗣後留心察勘。凡霍亂盛行。多在夏熱亢旱酷暑之年。則其證必劇。

自夏末秋初而起。直至立冬後始息。夫形形徂暑。溼自何來。祇緣今人蘊溼者多。暑邪易于深伏。迨一朝卒發。漸至闔戶沿村。風行似疫。醫者不知原委。理中四逆。隨手亂投。殊可歎也。余每治愈此證。必詢其人曰。豈未病之先。毫無所苦耶。或曰。病前數日。手足心如烙。或曰。未病之前。觀物皆紅如火。噫。豈非暑熱內伏。欲發而先露其機哉。智者苟能早爲曲突徙薪之計。何至燎原莫救乎。以胃液之存亡。決病情之生死。尤爲精識。味者肆行燥烈。助虐燥津。徒讀父書。可爲痛哭。道光直省此證大作。一覺轉筋。卽死。京師至棺木賣盡。以席裹身。而葬卒未有識爲何證者。俗傳食西瓜者卽死。故西瓜賤甚。余時年十一。輒與同學者。日飽啖之。卒無恙。今讀此論。則醫學之陋。不獨今日爲然也。素園楊照素識。

霍亂病機

十一

楊氏之論極是。余于是年亦日食西瓜。而闔家無染病者。卽其驗也。然是年霍亂。間有誤食西瓜而死者。爲友人董鑄范所親見。蓋宜服香薷之證。誤信此壇之語。以致寒涼遏抑而斃也。是亦不可不知。故處方論治。非辨證不可。本論第二篇治法。西瓜汁證。治有汗頻二字最妙。烏程汪日慎謝賦
王清任曰。道光元年。病吐瀉轉筋者。數省都中尤甚。傷人過多。貧不能埋葬者。國家發帑施棺。月餘。開費數十萬金。彼時醫工或云陰寒。或云火毒。余謂不分男婦老少。衆人同病。卽疫也。卓識或曰。既是疫。何以芩連薑附亦有或效者。余曰。芩連效在邪勝之時。薑附效在正虛之體。亦有服藥終不效。

必鍼刺而得愈者。試看所流之血。盡是紫黑。豈不是疫火之毒。深入于營分哉。以疫邪自口鼻由氣管達于血管。將氣血凝結。壅塞津門。津門津門上有一管。名曰津管。是由胃出精汁。水液不得出。故上吐下瀉。初得病時。宜即用鍼刺尺澤穴。出紫黑血。則毒氣外泄矣。蓋人身氣管。周身貫通。血管。周身亦貫通。尺澤左右四五根血管。刺之皆出血。皆可愈。尺澤上下刺之。亦可愈。一面鍼刺。一面以解毒活血之藥治之。雄按王氏親見臍腑而善鍼法。所論皆鑿鑿可信。非懸揣虛擬。可比。雖用藥非其所長。而以解毒活血四字為綱。亦具有卓見。

霍亂病精

三

補亡論曰。靈樞五亂之證。惟亂于腸胃一證。名霍亂。故作吐利。其餘四證。皆不作吐利。祇謂之亂氣。昔柳州之疾。蓋亂氣于心之證。非霍亂也。謂為乾霍亂者。雖謬。然尚不失為五亂之一。今則無復知亂氣之名矣。

治法彙曰。乾霍亂俗名攪腸沙。其狀欲吐不吐。欲瀉不瀉。撩亂揮霍是也。急宜探吐。得吐方可。不吐則死。法曰。既有其入。必有其出。今有其入而不得其出者。否塞也多。死得吐後方可理氣和中。隨證調治。

醫通曰。乾霍亂是土鬱不能發泄。火熱內熾。陰陽不交之故。或問方書皆言宿食與寒氣相搏。何以獨指為火耶。曰。昏亂躁悶。

非諸躁狂越之屬火者乎。每致急死。非暴病暴死之屬火者乎。但攻之太過。則脾愈虛。溫之太過。則火愈熾。寒之太過。則反并格。須反佐以治。然後火可散耳。古法有鹽煎童便。非但用之降火。且兼取其行血也。

此證病因非一。驟傷飲食者宜探吐。宿食為患者宜消導。氣鬱厥邪者宜宣豁。暑火直侵者宜清解。諸法並列于後。用者審之。

應其格拒反佐以治。真精語也。桂苓甘露飲治熱證。而用桂通脈四逆湯治寒證。而用豬膽汁。皆即此義。夢影中治陳一。案石膏芩連加細辛少許。燃照湯之用薤仁。亦此義也。若

霍亂病精

三

寒證而用芩連熱證。而用薑附。則正與病反。非反佐之義矣。謝城

又曰。脾胃喜香燥而惡臭溼。若素多溼滯而犯臭氣。則正氣鬱遏。腹痛乃作。或上連頭額俱痛。或下連腰腿俱痛。有痛死不知人。少間復甦者。有腹痛不時上攻水漿不入。數日不已者。甚至欲吐不吐。欲瀉不瀉。或四肢厥逆。而青脈伏。或偏體壯熱。面紫脈堅。俱與生黃豆嚼之。覺香甜者是臭毒也。急以燒鹽探吐。或以童便製香附四五錢為末。停湯頓服。最效。舉世有用水搭肩背及臂者。有以苧麻水溼刮之者。有以瓷碗油潤刮之者。有以瓷鋒鍼刺委中出血者。總欲使腠理開通之意耳。其脈多伏。或

細小緊澀或堅勁。指中帶促結。皆是陰逆陽伏之象。不可誤認陰寒而投熱藥。雖砂仁之辛溫香竄。亦不可輕用。若見面青唇黑。脈動搏指。脈逆喘促。多不可救也。

又曰。觸犯臭穢而腹痛。逆其脊背。隨發紅斑者。俗謂之沙。甚則欲吐不吐。欲瀉不瀉。乾嘔痞痛者。曰絞腸沙。更有感惡毒異氣而驟發黑沙。俗名番沙。卒然昏倒。腹痛面色黑脹。不呼不叫。如不急治。兩三時即斃。有微發寒熱。腹痛麻脊。嘔惡神昏者。或瀉汗出。或隱隱發斑。此毒邪微發于表也。亦有發即瀉利厥逆。腹脹無脈者。此毒邪內伏不能外發也。所患最暴。多有不及見斑而死者。經謂大氣入于臟腑。雖不病而卒死是也。初覺

霍亂病情

古

先將紙撚點。焯頭額。即以藜麥焙燥去殼取末三錢。涼開水調服。重者少頃再服。即安。蓋藜麥能鍊腸胃滓穢。降氣寬胸。而治濁滯。為沙毒之專藥。其毒甚而黑者。急于兩膝後委中穴。咬出血。以泄毒邪。凡驟發之病。勿慮其虛。非此急奪。束手待斃。原夫此病與臭毒相類。與霍亂相似。乃疫癘之最劇者。初起昏憤不省。脈多沉匿不顯。或渾渾不清。勿以腹痛足冷而與溫藥。如藜麥一時莫得。或服之不應。即宜理氣為先。如香蘇散加薄荷荊芥辛涼透表。次則辟邪為要。梔子豉湯加牛蒡生甘草解毒。和中表熱勢甚。清熱為急。黃芩湯加連翹木通分利陰陽。若見煩擾腹脹。脈來數疾。急投涼膈散以竹葉易生薑。則毒從下奪。

熱劇神昏。雖合三黃多不可救。煩渴引飲。遺溺。速清陽明白虎湯加茵陳。使毒從表化。斑點深赤。毒在血分者。濃煎益母草少投。生蜜放溫。恣服。取效最捷。以其專下惡血也。或加生薑煎汁半杯。總取散血之功。以上諸法。在未經誤藥。庶可挽回一二。曾見一商初到吳。會暢飲酣歌。席開雲時。不安。索生薑湯一啜。而逝。又有朔客到楓。覓混澡浴。忽然眩暈。嘔逆。到舟即斃。凡感受疫毒邪者。大忌更有誤認傷寒而與發散。周身厥紫如雲而死。者亦有誤認麻疹而與櫻柳櫻桃核湯。咽痛失音而死。者。亦有寒證而與熱劑。口變生反掌。不似時行。猶可遷延數日也。鼻流血而死者。變生反掌。不似時行。猶可遷延數日也。上海特海縣一邑耳。二十年來。屢遭兵燹。乃滄海漸變桑田。

霍亂病情

主

外國之經營日廣。蘇省又以為會垣。而江浙之幸免于難者。率遷于此。各省商船。櫓集帆檣林立。踵接肩摩。居然一大都會矣。然人煙繁萃。地氣愈熱。室廬稠密。穢氣愈盛。附郭之河。藏垢納污。水皆惡濁不堪。今夏余避地來遊。適霍亂臭毒番沙諸證盛行。而臭毒二字。切中此地病因。奈醫者茫然。竟有令人先服薑汁一瓊者。有以大劑溫補主治者。皆刊印徧貼通衢。病家信之。死者日以千計。道殣相望。錢塘吳菊潭茂才告余曰。目擊一人七竅流血而死。聞之惻然。豈亦劫運使然歟。

玉衡曰。先吐瀉而心腹疼痛者。從穢氣而發者多。先心腹疼痛

而吐瀉者。從暑氣而發者多。然吐瀉之霍亂。乃暑穢傷人氣分。宜用油鹽刮其皮膚。則痧不內攻。若心胸脹悶腹中疝痛。或如板硬。或如繩縛。或如筋甲。或如錐刺刀割。雖痛極而不吐瀉者。名乾霍亂。乃邪已入營。宜以鍼刺出血。則毒有所泄。然後再審其因而藥之。若痧脹已極。難于刮刺者。又必先以藥救醒。乃可以回生。明此三法。庶可十全。

王晉三曰。痧者寒熱之淫氣。皆可以為患。或四時寒淫凝滯于脈絡。或夏月淫熱鬱遏于經隧。或鼻聞臭氣而阻逆經氣。或內因停積而壅塞府氣。則胃脘氣逆。皆能脹滿作痛。甚至昏憤欲死。西北人以楊柳枝蘸熱水鞭其腹。謂之打寒痧。東

霍亂病情

共

南人以油碗或油綫刮其胸背手足內腑。謂之刮痧。以碗鋒及扁鍼刺舌下指尖及曲池委中出血。謂之鋤痧。更服玉樞丹等以治其內。是皆內外達竅以泄其氣。則氣血得以循度而行。其脹即已。實即霍亂耳。非另有痧邪也。雄按方書從無痧證之名。惟乾霍亂有俗呼絞腸痧者。是世俗之有痧。不知起于何時也。至醫說始載葉氏用蠶退紙治痧之法。以蠶性豁痰祛風利竅。其紙已經鹽醃而順下最速也。乃江民瑩誤為解伏證。雖為杭莖浦所譏。然亦可見從前痧證不多。故古人皆略而不詳也。迨國初時其病漸盛。自北而南。所以又有滿洲病與番沙之名。郭氏因襲雲林青筋之說。而著痧脹

玉衡一書。推原極變。其說甚辨。而痧之證治。乃備石頑復分臭毒番沙為二者。謂惡毒癘氣尤甚于穢邪也。晉三又辨痧即外邪驟入阻塞其正氣流行之道之謂。而痧之病義益明。至情志多鬱之人。稍犯涼熱。即能成痧。且不時舉發。亦由氣血失其宜暢也。右院雖有截痧方。而用藥殊乖。江氏以香附芩梔撫芎為劑。較為合法。其諸痧名狀。玉衡書具在。不多贅。長洲龍青霏脈學聯珠云。痧脹之證。多屬奇經。蓋奇經為十二經之支流也。五臟之清氣不升。六腑之濁氣不降。譬猶五湖四瀆漫溢泛濫。盡入江河。而清濁已混。更水甚土崩。泥沙渾擾流蕩不清。井膈壅塞。故其病有痧脹之名。痧脹者。猶沙

霍亂病情

七

漲也。總由十二經清濁不分。流溢入奇經。而奇經脈現。則為痧證也。邪氣滯于經絡。與臟腑無涉。不當徒以藥味攻臟腑。宜先用提刮之法。及刺法。使經絡既通。然後用藥。始堪應手也。雄按此說似創而實確。然經絡既通。雖不藥可愈。特慮邪已漸及府臟。則刮刺不足了事。譬如險要為賊所據。不可徒講防堵也。

疫疹一得曰。凡初起六脈細數沉伏。而色青慘。昏憤如迷。四肢逆冷。頭汗如雨。其痛如劈。腹內攪痛。欲吐不吐。欲瀉不瀉。此為悶疫。幾不終朝。

悶者熱毒深伏于內。而不能發越于外也。漸伏漸深。入臟而

死不俟終日也。固已治法宜刺曲池委中以泄營分之毒。再灌以紫雪清透伏邪。使其外達。或可挽回也。治法精良素圖

寒證

素問氣交變大論曰。歲土不及。民病飢泄霍亂。

歲土不及。則脾胃素虛之人。因天運而更見其虛。中陽既虛。寒溼自盛。以致朝食暮瀉。而為飢泄。甚加嘔吐。而為霍亂。觀其與飢泄並稱。則知利者必是清穀。而非臭穢。吐者亦必澄澈。而非酸濁。小便之利。口之不渴。又從而可必矣。如此纔是寒溼霍亂。可以理中五苓之類治之。故讀書須以意逆其理。自然觸處洞然無往而不貫矣。且寒霍亂多見于安逆之人。

霍亂病情

大

以其深居靜處。陽氣不伸。坐臥風涼。起居任意。冰瓜果恣食為常。雖在盛夏之時。所患多非暑病。王安道論之詳矣。輕則藿香正氣散。或平胃加木香藿香生薑半夏之類。溼盛而四肢重著。骨節煩疼者。胃苓湯加木香藿香大腹皮之類。七情鬱結。寒食停滯者。厚朴湯治中湯。頭疼惡寒無汗者。香薷飲先解其表。隨以大順散調其裏。如果脈弱陽虛腹痛喜得溫。按瀉出不臭者。來復丹。若吐瀉不止。元氣耗散。或水粒不入。或口渴喜冷而不多飲。或惡寒戰慄手足逆冷。或煩熱發躁。揭去衣被。但察其瀉出不臭者。乃內虛陰盛。陽宜理中湯。甚則四逆湯加食鹽少許。更有暴瀉如小汗。汗四逆脈弱。

不能言者。急進漿水散救之。宜冷服。然此輩實由避暑而反為寒傷致病。若拘泥時令。誤投清暑之劑。而更助其陰。則頃刻亡陽。莫挽矣。前人有治此證而愈者。尚未確知其為寒病也。遂謂夏月暑病。通宜熱藥。妄立陰暑名目。貽誤後人。此因偶中而錯認面目也。余于溫熱經緯辨之詳矣。至真要大論曰。諸病水液澄澈清冷。皆屬于寒。

或曰。醫者精脈理。諳藥性。胸羅經史。口熟方書。斯可以濟世矣。余曰。不可。必也能辨證。平苟不辨證。而但憑脈以用方藥。雖引古證。今有典。有則恐不免為二豎所笑也。惟聖人早料及此。以辨證之法。大書特書。垂示後世。可謂既詳且盡。豈但

霍亂病情

九

為霍亂分寒熱哉

傷寒論曰。霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者。理中丸主之。

此霍亂之因傷寒而致者。故兼有頭痛發熱身疼諸表證也。雖欲飲水而表證未罷。故以五苓散為兩解之法。二方皆為風寒而設。熱多謂表熱未衰。寒多謂裏寒較盛。于一病中察其內外之輕重。而辨邪氣之聚散。以施治法。聖人辨證詳盡如是。而後人顛預。或至誤會。凡夏秋熱霍亂之口渴者。輒用五苓多致債事。須知桂朮為渴家所忌。惟風寒之邪鬱阻氣機。致水液不行而渴者。始可用以行氣化水也。分析甚明。發前人所未發。

蓋熱多並非表裏大熱欲飲水亦與大渴引飲不同也謝城議

又曰吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

吐利止裏已和也身痛不休者表未解也故須桂枝和解其外所謂表病裏和汗之則愈也但此為寒霍亂後之兼有風寒表邪者而言若溫熱暑疫霍亂後之表未解者不得率爾引用也余擬駕輕湯一方最為合治然其意亦不敢出聖人之範圍也詳其一曰消息再曰小和之者蓋以吐利之餘裏氣已傷故必消息其可汗而汗之亦不可大汗而小和之也况熱霍亂後津液尤虛者其可妄施汗法乎故余但以輕清

霍亂病情

干

為制也

又曰吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也

吐利可發汗者傷寒霍亂也脈平為邪已解而小煩者以吐下後胃氣新虛不能消穀故霍亂病時內不可便與飲食必待胃漸下行為順而倉廩始開也暑熱霍亂尤奪胃津既以甘涼自能思穀

先曾祖秉衡公曰傷寒外感之總名傷寒論統論外感之書也先大父永嘉公曰難經云傷寒有五則五種外感古人皆謂之傷寒矣傷寒論有治風治溫治濕治瀉諸法則非專論一傷寒矣楊素園大尹曰注傷寒者無慮數十家皆以為專

論傷寒之書故恆覺支離附會不適于用雄嘗謂傷寒有五

癰亦有五不過重輕之別耳傷寒惟感寒即病者為正傷寒乃寒邪由表而受治宜溫散其邪在半表半裏或所感邪氣較輕不為傷寒而為正癰者脈象必絃並宜和解設冬傷于寒而不即病則為春溫夏熱之病其較輕者則為溫瘧瘧瘧若感受風溫溼溫暑熱之氣者重則為時感輕則為時瘧今世溫熱多而傷寒少故瘧亦時瘧多而正癰少惟葉天士先生精于溫熱暑溼諸感故其治瘧也一以貫之余師其意凡治時瘧必辨其為風溫為溼溫為暑熱為伏邪者仍以時感法清其源故四十年來治瘧無難愈之證推而廣之似不止

霍亂病情

五

瘧疾爾也如風寒暑溼皆可以為霍亂則冬寒內伏至春夏不為溫熱病亦可以為霍亂也特不多見故從來無人道及今年春夏之交余在濮院即有是證未交芒種薄遊海上則沿門闔戶已成大疫蓋去冬積雪久凍傷于寒者較深而流離失所斗米千餘精神之不藏者既多中氣之不餒者亦罕且今春過冷入夏甚涼殆肅殺之氣未消發生之機不暢故伏邪不能因升發之令外泄以為溫久伏深藏如姦匪潛匿毫無覺察或其人起居飲食之失調或外感稍侵而引動遂得乘機卒發直犯中樞而為霍亂故多無腹痛之兼證而愈後輒有餘波與向來夏秋所行因于暑溼為患者證候則一

病情迥殊也。治法亦稍有不同。然伏邪化熱自裏達外。與伏暑內發。理無二致。故其人必口渴。而刺血則紫黑。不知者以爲暑令未行。有何熱證。放膽薑附。塗炭生民。豈亦劫運使然耶。可哀也已。鎮海周君采山。極爲折服。遂以此說刊印。傳播遠近。元和金君簠齋。同邑周君二郊。秀水呂君慎庵。烏程汪謝城。孝廉桐鄉陸定圃。進士皆見而韙之。爰贅于傷寒霍亂後以諗來者。

又曰吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥逆者。四逆湯主之。此陽虛之體。寒邪得以直入。而爲霍亂也。發熱惡寒者。身雖熱而惡寒。身熱爲格陽之假象。惡寒爲虛冷之真諦也。四肢

霍亂病機

三

拘急。手足厥逆者。陽氣衰少。不柔于筋。不溫于四末也。首重汗出者。爲陽有外亡之象。故徑用四逆湯祛其既入之寒。而挽其將去之陽。若止見厥逆惡寒。四肢拘急。脈來沉細絃緊。面如塵土。瀉出不臭。雖屬陰寒。而無汗出之候者。但宜冷香飲子治之。寒主收引。故四肢拘急。乃筋強不能屈伸之謂。與熱證之轉筋迥殊。臨證極宜分別。苟或顛倒誤施。禍不旋踵。又曰既吐且利。小便復利而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。四逆湯主之。

此亦虛冷霍亂之候。四肢拘急。手足厥逆。虛冷之著于外也。下利清穀。脈微欲絕。虛冷之著于內也。虛冷甚于內。則反通

其陽于外矣。故其外候每多假熱之象。或煩躁去衣而欲坐地。或面赤喜冷而不欲飲。或脈大虛絃而不任按。是皆元氣耗散。虛陽失守。甚加喘噦。最爲危險。惟四逆湯可以驅內勝之陰。而復外散之陽。但既吐且利之下。緊接曰小便復利。重中曰下利清穀。何其丁寧而鄭重耶。故讀者最宜著眼。洵溪所謂一證不具。卽當細審也。儻熱霍亂因暑邪深入而滯其經隧。顯脈細肢寒之假象者。必有溺赤便臭。口渴苔黃之真諦。臨診慎毋忽焉。

又曰吐下已斷。汗出而厥。四肢拘急。脈微欲絕者。通脈四逆加豬膽汁湯主之。

霍亂病機

三

尤拙吾曰。吐下已止。陽氣當復。陰邪當解。乃汗出而厥。四肢拘急。而又脈微欲絕。則陰無退散之期。陽有散亡之象。于法爲較危矣。故于四逆加乾薑一倍。以救欲絕之陽。而又慮溫熱之過。反爲陰氣格拒而不入。故加豬膽汁之苦寒。以爲嚮導之用。卽內經盛者從之之意也。

又曰少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。少陰病吐利。煩躁四逆者死。

寒中少陰。吐利交作。陰邪盛極。而陽氣不勝也。然先厥冷而後煩躁者。猶有陽欲復而來爭之兆。故以吳茱萸溫裏散寒。人參大棗益虛安中爲治也。若先煩躁而後四逆者。陽不勝

而將絕也。故死。此二條本少陰中寒。非霍亂也。然有類乎霍亂。既明霍亂之治。復列其類證。以廣其例。俾臨證不致眩惑也。

又曰。少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。急下之。宜大承氣湯。

寒邪化熱。傳入少陰。逼迫津水。注為自利。質清而無滓穢。相雜色青。而無黃赤相間。可見陽邪暴虐之極。反與陰邪無異。但陽邪傳自上焦。其人心下必痛。口必乾燥。設係陰邪。則心下滿而不痛。口中和而不渴。必無此枯槁之象。故宜急下。以救其陰也。夫既列少陰中寒二條于前。以明霍亂類證之治。

霍亂病情

居

更附少陰急下一條于此者。以病係傷寒。迨既化熱。雖見脈微細。但欲寐之少陰證。而口乾燥。心下痛。自利清水。尚宜急下。其病非傷寒。脈不微細。神情瞢亂。而口渴。心下拒按之霍亂證。顧可以燥熱藥治之哉。內經以水液澄澈清冷為寒。此證雖自利清水。必熱而不冷。或小溲赤短。審問之。自有分別。而仲聖于下利證。專以口渴與否。判清溫之治。尤為簡當。臨證者。當奉為南鍼也。

此證最宜細辨。余嘗見一霍亂輕證。醫投涼膈散。次日下血而殞。謝城。

千金要方曰。霍亂四逆。吐少嘔多者。附子杭米湯主之。○治中

湯治霍亂吐下。脹滿食不消化。心腹痛。

病源曰。霍亂者。由人溫涼不調。陰陽清濁二氣有相干亂之時。其亂于腸胃之間者。因飲食而變發。則心腹疝痛。其有先心痛者。先吐。先腹痛者。先利。心腹並痛者。則吐利俱發。挾風而實者。身發熱。頭痛。體疼。而復吐利。虛者。但吐利。心腹刺痛而已。亦有飲酒食肉。腥膻生冷過度。因居處不節。或露臥溼地。或當風取涼。而風冷之氣。歸于三焦。傳于脾胃。脾胃得冷。則不磨。不磨則水穀不消化。亦令清濁二氣相干。脾胃虛弱。便作吐利。水穀不消。則心腹脹滿。皆成霍亂。

霍亂病情

居

也。巢氏所論雖詳。乃尋常寒霍亂耳。執此以治時行霍亂。猶腐儒將兵。其不覆敗者鮮矣。

又曰。霍亂而轉筋者。由冷氣入于筋故也。冷入于足之三陰。三陽則腳轉筋。入于手之三陰。三陽則手轉筋。隨冷所入之筋。筋即轉轉者。皆由邪冷之氣。擊動其筋而移轉也。

轉筋有因熱因寒之異。須合兼證脈候而辨析之。無病之人。亦有時患轉筋者。不過足受微涼。不足為病。乃時醫專以轉筋為邪入三陰。詎知三陽亦能轉筋。巢氏之論甚明乎。謝城。

又曰。乾霍亂者。是冷氣搏于腸胃。致飲食不消。但腹滿煩亂。疝

痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名爲乾霍亂也。

乾霍亂屬寒溼者固有之挾食者亦或有之亦有因寒溼而夾穢臭惡毒之氣者故治法審非暑火爲患不可誤用清涼但宜芳香辛散以宣通之其薑附椒巴等劑勿輕信而妄試也。

醫道通治道治國者必察民情聽訟者必察獄情用藥如用兵爲將者必察敵情爲醫者必察病情民情得而政教行獄情得而曲直分敵情得則勝權獨操可以寡克衆可以逸待勞病情得則生機在握可以禦疹癘可以挽造化嗚呼不辨虛實寒熱而治霍亂者猶之棄其土地人民而

霍亂病情

請戰守也故列病情第一

隨息居重訂霍亂論第二治法篇

海昌王士雄夢隱集

鎮海陳亨春泉校

伐毛

霍亂及痧脹疫癘諸惡證初起卽解散其髮細看如有赤色者急拔去之再脫其衣細看胸背如有長毛數莖必盡拔之

熱毒深入營分髮爲血之餘毒焰上炎故見赤色甚至髮如髮蠟余嘗目擊之 宗姓示烈紹式

取嚏

霍亂諸痧皆由正氣爲邪氣所阻故濁氣不能呼出清氣不能

霍亂治法

吸入而氣亂於中遂成閉塞之證濁氣最熱泰西人謂之炭氣炭氣不出人卽昏悶而死然呼出肺主之肺開竅於鼻用皂角末或通關散或痧藥吹入鼻中取嚏以通氣道則邪氣外泄濁氣可出病自鬆也

刮法

取嚏不論有無隨瀉以刮有嚏者肺氣雖開恐營衛氣機尚痺當刮以宣之無嚏者肺既不開尤必刮鬆衛氣使已入營分之邪得以外泄而病可鬆也故肩頸背胸前脇肋兩肘臂兩膝灣等處皆宜用綿紗線或苧麻繩或青錢或瓷梳口蘸菜油自上向下刮之以紅紫色綻方止項下及大小腹軟肉處以食鹽

研細。用手擦之。或以指蘸清水撮之。景岳云。凡毒深病急者。非刮背不可以。玉臟之系咸附於背也。或以鹽擦背亦可。

燂法

營衛之氣為邪氣所阻而不流通。則手足厥冷而腹痛。身有紅點而隱躍。此名斑痧。亦曰番痧。俗以其厥冷。謂之陰痧者。謬也。宜以燈心微蘸油。點火燂之。以燈火近肉。即提起。燂燂有聲。病即鬆。

刺法

玉衡曰。東南卑溼。利用砭。以鍼刺放毒血。即用砭之道也。凡霍亂痧脹邪已入營。必刺出毒血。俾邪得外泄。然後據證用藥。可

以望生。

第一宜刺少商穴。刺時扶病人坐直。男左女右。用力將其手臂從上將下。將其惡血聚於指頭。以油頭繩繫住寸口。用尖銳銀鍼在大指甲向裏如韭菜許刺之。擠出毒血。即鬆。重者兩手並刺。若神昏不醒。刮刺不鬆者。為邪入心包絡。須擇開病人之口。看舌底有黑筋三股。男左女右。用竹箸嵌鋒刺出惡血一點。兩臂灣名曲池穴。兩膝灣名委中穴。以手蘸溫水拍之。露出青筋紅筋。若肌膚白嫩者。則露紫筋。皆痧筋也。並用銀鍼刺出紫黑毒血。其腿上下大筋不可刺。刺亦無毒血。反令人心煩。腿兩邊鞭筋上筋不可刺。刺之恐令人筋甲。按談往云。崇正十六年有

疔瘡瘋羊毛瘟等疫。呼廟即亡。不留片刻。八九兩月死者數百萬。十月間有閩人曉解病由。看膝灣後有筋突起。紫者無救。紅則速刺出血可活。至霜雪漸解。勢始漸殺。余謂此疫雖奇。殺人既速且多。然無非暑熱毒氣深入於絡耳。故輕者刺之可活。而霜雪解病自衰也。考嘉興王肱枕刺菴瑣語。及桐鄉陳松濤災荒記事。皆云。崇正十四年大旱。十五十六經年亢旱。通國奇荒。疫癘大作。合三書而觀之。其為暑燥熱毒之邪。深入營分無疑矣。故委中之筋已突起。不待拍之而始露。詳載之以為留心民命者告。

玉衡又云。一應刺法。不過鍼鋒微微入肉。不必深入。又以諸穴

非親見不明白。故不具載。而故人管榮棠謂余曰。曩遇桐鄉八十老人張德祥者。善治痧。數十年來生死於其鍼下。百不失一。凡鍼入而肌肉凝閉者。必不得生。然其所刺部位。不僅郭氏所言之十處。惜世罕知也。據云。

痧證頭暈者刺素髻。穴在鼻柱上端準頭鍼入一寸。頭痛者刺風府。穴在項後入髮際一寸。大筋內宛宛中。鍼入一寸。

偏痛者刺風池。穴在耳後顙額後腦空下髮際陷中。鍼入一寸。

腹痛而吐者刺上脘。穴在臍上五寸。鍼入一寸。

腹痛而瀉者刺下脫。穴在臍上二寸。鍼入一寸。腹瀉而欲吐不吐。欲瀉不瀉者刺中脫。穴在臍上四寸。鍼入一寸即愈。以上三穴須用手極力提起其皮而刺。切以上六穴並不出血。

手癰者刺商陽。穴在手次指內側。去爪甲如韭葉。出血立已。足中者刺厲兌。穴在足次指之端。去爪甲如韭葉。出血立已。刺承筋。穴在脛後足跟上七寸。出血立已。刺承山。穴在脛肚下分肉間。出血立已。但此穴非精明者不易取。宜慎刺。牙關緊閉者刺人迎。穴在結喉兩旁一寸五分。大脈動應手處刺之立開。按張昺刺法。必有所授。榮榮得其傳。故鍼痧極

神。且榮榮之爲人也。好善而率真。非牟利妄語者流。故余甚信之。嘗刊入叢書。今備錄此篇。以便窮鄉僻壤。皆可按證而施治也。又痺筋證治云。凡心口腰脊胸脇等處。切勿誤聽愚人妄施鍼刺。親見一人因心口一鍼。立時殞命。不可不知。

搗洗

生大蒜杵爛貼兩足心。吳茱萸一兩研末。鹽酒和塗兩足心亦可。車轂中脂亦可塗。

男子以手挽其陰。女人以手扯其兩乳。

辣蓼草。入兩木瓜。四兩老酒。二加水煎。乘熱搗患處及手足濕身。辣蓼草乃水紅花之別一種。葉狹小而光。兩面皆綠。梗微

亦有節。其味甚辛。合六神麴及造酒麴皆用之。鷄生強。但以此草置鷄棲內即愈。

鹽酒頓熱淋洗。併以手蘸摩擦其患處。如無鹽酒。可代也。按鹽散

風火化淫熱。平人常用鹽酒濯足。永無足疾。若路途患此倒

地者。但以病人兩腳浸溺桶中亦妙。

綿絮浸酒中煎滾取出。乘熱裹患處。或以燒酒摩擦其患處。

以軟散爲度。燒酒內入盤螯末。力更勝也。腳不冷者。但以鹽

研細擦之。

水煮青布揭腳膝。冷即易之。柏葉杵爛裹之。併煎淋洗。

熨灸 主霍亂轉筋。乾霍亂之屬寒者。

霍亂治法

五

炒鹽一包。熨其心腹。令氣透。又以一包熨其背。待手足煖。再服

神香散一錢。寒重者再服。四篇。或以吳茱萸食鹽各數兩炒熱。

包熨臍下亦妙。或以芥子研末和塗臍上。

胡椒粒。以布包之。嚼碎納臍中。用膏藥封之。再以熱手按之。蓋

被臥少頃。腹中熱有汗。則寒邪散矣。甚者用回陽膏貼臍間。

方見。或以鹽填臍中。上蓋蒜片。灸二七壯。危甚者再灸臍兩

旁。各開二寸之天樞二穴。臍上四寸中脘一穴。臍下寸半氣海

一穴。

外臺法。以手挽所患腳大拇指。當腳心急筋上灸七壯。

喻氏法。凡卒中陰寒。厥逆吐瀉。色清氣冷。棄列無汗者。用茵一

大握以帶束緊切去兩頭留白寸許以一面熨熱安臍上用熨斗盛炭火熨齒上面伸熱氣從臍入腹甚者連熨二三餅又甚者再用艾炷灸關元氣海各二三十壯若陰虛素疏陰盛逼陽而多汗者用附子乾薑回陽之不暇尚可熨灼以助其散越乎嘗讀仲聖傷寒論知病屬陰虛血少者概不可灸必陽虛氣弱者始可用灸今喻氏復辨陽虛者固宜用灸若陽虛至於外越者豈容再灸是亦發人所未發可補長沙之未及矣世之不別陰陽而妄施灼灸以傷人者豈特霍亂為然乎吁可歎已又按凡腹雖痛極而喜得溫按唇口刮白者乃內虛陰寒之病宜用火灸切忌鍼刺若四肢雖冷而苦渴苔膩腹痛雖甚而睛赤唇紅或煩躁喜涼者乃熱鬱氣閉之證急宜刺血切忌火攻設不辨明而誤用之禍皆反掌

霍亂治法

六

偵探

生黃豆細嚼不腥者痧也既可試病亦解痧毒生芋亦可大赤雄雞一隻放病人腹上以雞口朝其面雞即伏而不動痛止雞自跳下亦治尸厥中惡神清而嗜薑不辣者真寒證也

策應

新汲井水 百沸天泉 各半和服名陰陽水頻湖日上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調和升降周流則臟腑

暢達一失其道二氣清氣濁陰不降清陽不升故發為霍亂吐利之病飲此即定者分其陰陽使得其平也按汲井泉以上升天雨水而下降故汲者宜新而降者宜熟也以之煎瘧疾藥蓋取分解寒熱之邪而和其陰陽也

東壁上 煮汁飲 聖濟

鍋底墨煤 竈突止墨煤各五 百沸湯急攪數千下以碗覆之通口服一二口 經驗

屋下倒挂塵 沸湯泡澄清服 易簡

生扁豆 研入醋少許新汲水和服 普濟

絲瓜葉一片 白霜梅肉一錢 併研中 共研爛新汲水調服 廣

記

霍亂治法

七

梨樹枝 煮汁服 聖惠

海桐皮 煮汁飲 聖濟

路旁破草鞋 煮汁飲 聖濟 水煎服 事海文山

生藕 搗汁飲 聖惠

陳倉米 煮清湯稍稍飲之治霍亂大渴 永類鈴方

冬瓜 水煮清湯俟涼飲之 牛痘 按陳倉米雖云清熱止渴惟

霍亂已止者服之為宜若邪勢力張吐下未平之際尚嫌其守冬瓜甘淡微涼極清暑溼無論病前病後用以代飲妙不可言即溫溼暑疫瀉痢諸病皆可用也

蘆根 麥冬 永煎服 千金 按單用蘆根煎飲亦止煩渴或與

竹葉同煎更佳

梨肉 煮湯服渴甚搗汁飲 夢隱

蘆根 煮湯服或生嚼嚥汁吐去渣 夢隱

生綠豆 急火煎清湯涼服 夢隱

枇杷葉 刷去濃煎徐飲此方不但解霍亂之渴也若深冬采之

刷毛洗淨切碎淨鍋炒乾瓷餅密收常以代茗可杜暑溼時疫

及噎呃諸病 夢隱

雄雞矢白 臘月收之爲末水和溫服 金匱 以下治霍亂轉筋

地漿 掘黃土地作坎深三尺以新汲井水沃入攪之少頃取

霍亂治法

清者飲三五杯 千金 按羅謙甫云霍亂乃暑熱內傷七神迷亂

所致陰氣靜則神藏躁則消亡非至陰之氣不愈坤爲地屬陰

土曰靜順地漿作於陰地坎中爲陰中之陰能瀉陽中之陽也

愚謂得羅氏此言治霍亂已思過半矣蔣式玉稱其勤求古訓

洵不誣也

新汲井水 徐徐冷飲之外以一盆盛水浸兩足忌食熱物

救急良方 按果係暑熱熾盛用臘雪水尤勝

扁豆葉一握 搗絞汁一碗飲 廣筆記

桑葉一握 煎汁服 聖惠

木瓜一兩 水煎服餘湯浸青布裹其腓本方加桑葉七片尤

良聖惠

龍腦薄荷 煎湯飲 聖惠 按有汗者此方勿服

青錢九枚 木瓜一兩 烏梅 炒玉水二錢煎分溫服 聖濟 按此方專

治風木行脾之證時行重感非所宜也

鹽梅 煎湯細細飲 如宜 按方義與上同

垂死者用敗蒲席一握切漿水一盞煎服 聖惠

百方不效困篤者用室女月經衣和血燒灰酒服方寸七 千金

按邪入已深故百方不效以此藥專走血室能引濁邪下行也

原蠶砂一兩 陰陽水煎澄清溫服 夢隱 按蠶砂乃桑葉所化

夫桑葉主息風化滯故聖惠方以之治霍亂轉筋也既經蠶食

霍亂治法

蠶亦主勝風去溼且蠶僵而不腐得清氣于造物者獨純故其

天不臭不變色殆桑從蠶化雖走濁道而清氣獨全金匱以雞

矢治霍亂轉筋者雞屬巽雖不瀉而矢獨乾亦取其勝風溼以

領濁氣下趨也蠶砂既引濁下趨又能化濁使之歸清性較雞

矢更優故余用以爲霍亂轉筋之主藥頗奏膚功嗣見治痧飛

龍奪命丹用人中白一味領諸藥迅掃濁邪下趨陰竅較他方

之藉硝以達下者更覺貼切故奏效尤捷制方之義可謂精矣

至來復丹之用五靈脂亦從雞矢白脫胎也

霍亂轉筋大渴苦黃汗頻無溺者 西瓜絞汁飲 夢隱

凡陽氣遏抑在內雖熱證亦無汗西瓜汁當慎用此特標汁

類二字最確當 謝城

渴而氣機不舒者 金銀花蒲公英絲瓜葉絲瓜竝可搗汁服或用乾者煎湯亦得 夢隱

渴而膚有赤色者 益母草或紫花地丁搗汁飲或以乾者煎湯服亦可 夢隱

按紫花地丁亦名如意草主清血熱生嚙之味

甘不作草氣故可同諸草木葉咀食充饑悉無草氣洵救荒之

仙草也附及之以爲世告

取麥焙燥去殼取末三錢 涼開水調服 簡便方

施子二七枚燒研 酒調下 川後

鹽一撮放刀上用火炙透 熱童便和服或以新汲水和服少

頃即得吐下而氣通矣 柳川

益母草一兩 煎湯少投生蜜放溫服 醫通

馬蘭根 細嚼嚙汁 壽域

劉寄奴 煎湯溫服 聖濟

桃葉 煎湯溫服 外臺

石菖蒲一兩 杵汁和水服 聖惠

烟管中油 俗呼 取豆大一丸放病人口內搦水灌之下嚙即活

有堂

蕪菁子 煮汁飲 集簡

黑大豆 生研水服方寸七 普濟 按今人以黃豆試痧本此

垂危者用生芋一片放入病人口內嚙汁即甦甦後再喫幾片取其寬腸去垢濁破血清痧毒也世傳飲油吞礬二方取其引吐澄濁也然油滋膩礬兇澀皆有流弊吾不取也

普洱茶 濃煎溫服 夢隱

淡海蛇 西地 即勃勝一名水煮至海蛇炸取汁溫服 夢隱

蘆根 搗汁飲 夢隱

雄鼠矢 陰陽水十二七枚 夢隱 按經驗方有馬矢絞汁治乾

霍亂一方雖取義燥溼降濁然臭味惡劣徑以礬汁灌人亦覺

難堪易以鼠矢較近人情其功似亦稍勝也

蘆葉 冬月挂樹上或攤屋上直至春前乾燥極透時收入淨

場密貯每一兩洗淨 水煎溫服 夢隱

按此味竝治時行喉證諸般外感瘧痢泄瀉疳膨黃疸水腫腳氣諸病如神物易功多

價廉無損家家可備以濟世也

稻稈 濃煎溫服 夢隱

六一散 方見四篇 新汲水調下三錢 河間

紫雪 方見四篇 下同 以下皆治邪深入絡以及干臟之乾霍亂霍亂轉筋一

碧雪

絳雪 一名紅靈散

行軍散

玉樞丹

紫金丹

飛龍奪命丹 與外科飛龍奪命丹名同藥異外科之方用蜈蚣之方用諸多寶貴香靈之品藉入中白錫輕就熟為使力能迅掃穢惡之邪下趨濁道有馬到功成之捷效以駿馬有飛龍之名方 按以上諸方皆有起死回生之力惟有力者卒不易得無力者貴不易購苟能量力合送或集資廣濟洵造福無涯矣

陳艾葉

煎湯服 外臺 以下治寒濕乾霍亂 紫蘇 搗汁服 乾者煎飲 別後 按此方治因食魚蟹諸水族而

腹痛吐利者皆效

橘紅

藿香 冬五煎服 百一選方 煮湯服 獨行方

霍亂治法

十一

薑炙厚朴研

溫湯服三錢 挾暑者新汲水下 聖惠 丁香十四枚 研末沸湯和服 千金 按此治食蟹及水果太多

而痛瀉者並效

真神翅三錢

水煎溫服 夢隱 吳茱萸二七枚 砂仁一錢 研泡湯吞下 夢隱

伽南香

涼開八磨取三分沸湯點服 夢隱

三聖丹

方見四篇下同 以下皆治陰寒霍亂

速效丹

姚氏蟾酥丸

霍亂散

同陽丹 以上數方亦須緊備應用如合送 霍亂轉筋吐下已多脈無氣短大汗欲脫者 置好醋二三斤

丁病人面前將鐵器燒紅頻淬醋內使聞其氣即可轉危為安

足冷者併搗生附子二兩貼于涌泉穴再按證用藥以挽回元

氣不論寒熱二證凡元氣欲脫者皆當亟用余屢試多驗並治

產後昏暈及諸病之神魂不安者皆效

紀律

一忌米湯得穀者昌百病之生死判于胃氣之存亡猶之兵家

餉道長為要事惟時邪霍亂痧脹獨不然者以暑溼穢惡之邪

霍亂治法

十二

由口鼻吸入肺胃而阻其氣道之流行乃否塞不通之病故濁

不能降而腹痛嘔吐清不能升而泄瀉無噎或欲吐不吐欲瀉

不瀉而竊踞中樞苟不亟為展化宣通邪必由經入絡由府入

臟而滋蔓難圖矣凡周時內一日米湯下嚥即服逆不可救者

正以穀氣入胃長氣于陽凡煮成湯液尤能開滯隨絡何異資

寇兵而齎盜糧哉惟吐瀉已多邪衰正存者猶之寇去民窮正

宜撫卹須以清米湯溫飲之以為接續不可禁之太過反致胃

氣難復知所先後則近道矣

物性中和莫如穀矣為生人之至寶乃霍亂痧脹邪勢方張之

際不可一試米湯如是況補藥乎其霍亂間有得溫補而愈者

是中虛之霍亂。非時行之霍亂也。須知中不必皆虛。虛不必同時。而病不必皆成霍亂。既同時而病霍亂。豈非外邪爲患。而流行漸廣。遂成疫癘。何司命者尙不識其病情耶。凡一病有一病之宜忌。先議病後議藥。中病卽是良藥。故投之而當。確黃卽是補藥。投而不當。參朮皆爲毒藥。譬如酒色財氣。庸人以之殺生。而英雄或以之展抱負。禮樂文章。聖人以之經世。而賢儒反以之誤蒼生。藥之于醫也亦然。補偏救弊。隨時而中。病無定情。藥無定性。顧可舍病而徒以藥之純駁爲良毒哉。

或云扶陽抑陰。治世之道。古聖以之立教。景岳以之喻醫。今人身不治。病亂于中。竟闕溫補扶陽。惟事清解助陰。毋乃偏任寒

霍亂治法

涼。將起後人之議乎。余曰扶陽抑陰。大易原以喻君子小人。故章虛谷謂但可以論治世。不可以論治病。惜章氏尙一川未達也。夫人身元氣猶陽也。外來邪氣猶陰也。扶正抑邪。豈必專藉熱藥哉。如熱傷胃液。仲聖謂之無陽矣。然欲扶其陽。必充其液。欲抑其陰。須撤其熱。雖急下以存陰。而急下者下邪也。下邪卽是抑陰。存陰者存正也。存正卽是扶陽。苟知此義。則易理醫理。原一貫也。設但泥溫補爲扶陽之藥。而不知陰陽乃邪正之喻。雖滿腹經綸。無非是蒼生之羅網。治人治世無二致也。或又曰丹溪謂人身陰不足。景岳謂人身陽不足。君以爲孰是。余謂人身一小天地。試以天地之理論之。陰陽本兩平而無偏。

也。故寒與暑爲對待。晝與夜爲對待。然雨露之滋。霜雪之降。皆所以佐陰之不足。而制陽之有餘。明乎此。則朱張之是非判矣。或又曰子言扶正卽是扶陽。則補陰補陽皆扶陽也。抑陰卽是抑邪。則逐寒逐熱皆抑陰也。顧專事逐邪。不崇補正。得毋未合扶陽抑陰之旨乎。余因述先慈之訓以答曰。無論外感不可妄投溫補。卽內傷證。必求其所傷何病。而先治其傷。則病去而元自復。古人不曰內虛而曰內傷。顧名思義。則純虛之證殊少也。徐洄溪亦云。大凡人非老死卽病死。其無病而虛死者。千不得一。尤病去則虛者亦生。病留則實者亦死。故去病正以扶陽也。余嘗謂人氣以成形耳。法天行健。原無一息之停。惟五氣外侵。

霍亂治法

或七情內擾。氣機愆度。疾病乃生。故雖在極虛之人。旣病卽爲虛中有實。如酷暑嚴寒。人所共受。而有病有不病者。不盡關乎老少強弱也。以身中之氣有愆有不愆也。愆則邪留著而爲病。不愆則氣默運以潛消。調其愆而使之不愆。治外感內傷諸病。無餘蘊矣。霍亂云乎哉。不惜傾筐倒篋而出之。嘉惠後學之心至矣。讀此而猶不悟。請勿從事于此道也。隨園云人之氣血有壅滯之處。則其壯者爲癰疽。而其弱者爲勞瘵。余嘗佩服以爲名言。今讀此論與二語正相合。定州楊照素素圖。或又曰經言邪之所湊。其氣必虛。亦不然乎。曰人身氣血原有。

強弱。強者未必皆壽。弱者不必皆夭。正以氣血雖強。設為邪湊。而流行愈度。似乎虛矣。不去其邪。則病愈實。而正愈虛。馴致于死。雖強而夭折矣。氣血雖弱。不為邪湊。則流行不愆。不覺其虛。即為邪湊。但去其邪。則病不重。而正自安。雖弱亦得盡其天年矣。試看勇如賁育之人。身軀不覺其重大者。以正氣健行不息也。卒受痧邪。亦遂肢冷脈伏告斃者。以氣為邪閉。而血肉即死也。所謂邪之所湊。其氣必虛者。當作如是解。凡治此證者。將急開其閉。以宣通乎。抑從而下石。更投補塞乎。不但痧證爾也。凡病未去而補之。則病處愈實。未病處必愈虛。以未病處之氣血。皆挹而注于病處也。蓋所謂補藥者。非能無中生有。以增益人

霍亂治法

六

身氣血也。不過其衰多益寡。挹彼注此之能耳。平人服之。尚滋流弊。况病人乎。故經言不能治其虛。焉問其餘。夫既虛矣。尚曰治而不日補。可不深維其義乎。不但治人爾也。治家者。若以積財為務。有入而無出。甚則坎土穴牆以藏理之。是故一人小積。則受其貧者百家。一人大積。則受其貧者萬家。雖然。吝者之積財。以為久聚而不散矣。禍災之來。兵寇之攻。取百年之財。一日而盡之。安見其果不出也。治國者。若以積財為務。必至四海困窮。天祿永終。是天下之財源。如人身之氣血。俾得流通。灌注病自何來。故以論霍亂而併及之。

吾叔于道光閒。輻裕後須知書。以厚末俗。因采魏昭伯客

說一條頗招臂議。詎十餘年來。其言輒應。可慨也已。至于治虛。尤獨擅一時。憶丁巳春。烈年二十七。在上海患吐血。諸醫用清火補陰等藥。久治不瘳。勢瀕于殆。返杭求診。投大劑參耆。數服而痊。迄今無恙。且苗實勝于曩時。雖流離播越。尚能勝任也。今讀此論。謹書以識感佩之忱。紹武

今夏先生來申。適誤患身熱便瀉。口乾。幸能納食。仍強起任事。先生察脈絃大。曰此憂勞過甚。元氣大虧之證也。投大劑參芪。茯苓。防芍。橘餅。木瓜。旬日而痊。即旋里省親。踰月抵滬。患寒熱。先生視為暑溼類。瘧。授清化藥四帖。霍然。但覺疲憊。仍以參耆。甘藥等。峻補而瘳。治虛獨擅一時。豈不信哉。歸安

陳廷謨半樵

霍亂治法

七

二忌薑糖。徐氏云。如有暑邪。薑斷不可用。誰與岑連並行。亦不可也。况獨薑湯乎。惟初起挾寒者。或可量證略用些須。糖助溼熱。而膩滯滿中。誤用之。反為穢濁之邪。豈穢矣。不但增其嘔吐已也。推而至于棗子。龍眼。甘草。一切甜膩守滯之藥。類可知矣。三忌熱湯酒醴。澡浴。此三者皆驅寒之事也。寒傷形。則客邪在表。飲以熱湯酒醴。或煖房澡浴。皆可使寒邪從汗而解也。故表散寒邪之藥。每佐甘草薑棗之類。俾助中氣。以托邪外出。亦杜外邪而不使內入。若暑溼熱疫穢惡諸邪。皆由口鼻吸入。直傷氣分。而漸入營分。亟宜清涼疏瀉。俾氣展濁行。邪得下走。始有

生機。不但辛溫甘膩一概忌投。卽熱湯酒醴澡浴。皆能助熱。熾之。披猖。不可不嚴中厲禁也。

四慎。痧丸痧藥方最多。而所主之證不一。有宜于暑熱病者。有宜于寒濕病者。豈可隨便輕嘗耶。更有不經之方。羣集猛厲之品。雜合爲劑。妄誇無病不治。而好仁不好學者。廣製徧送。問有服之亦效者。大抵皆強壯之人。風餐露宿。爲病也。概施于人。多致輕者重。而重者死矣。故服藥難。施藥不易。必也擇方須良。擇藥須精。刊列證治。須分寒熱。實心實力行之。斯有功而無弊焉。如酷暑烈日之中。路途卒倒者。雖不可以霍亂痧脹名之。而其病較霍亂痧脹爲尤劇。設以泛泛痧藥治之。毋致不救。或曰鼻

霍亂治法

六

出血而死。此爲暑邪直入心包。絡必以紫雪灌之始效。然此藥貴重難得。有力者能備以濟世。必有善報也。凡陰虛內熱之人。或新產血去陰傷之後。酷熱之時。雖不出戶庭。亦有患此者。余見屢矣。詳三篇夢影中。

五慎。延醫之川藥。猶將之川兵。食祿之將。尙鮮其良。謀食之醫。宜乎其陋。然十室之邑。必有忠信如某者矣。語云爲人子者。不可不知醫。要在平時留意。知其有活人之術。而非道聽塗說者流。則有病時方可以性命託之。知其有用兵之才。而非惜死愛錢之輩。則有寇時方可以土地人民託之。噫。難矣。六慎。喉藥。選醫難。如選將。選得矣。或徒有虛名。而無實學。或飽

學而非通才。或通才而無卓識。或見到而無膽略。或有膽而少周詳。皆不足以平大亂。愈大證也。故服藥如用師。聖人以戰疾。玆慎也。然則如何而可服其藥耶。但觀其臨證時。審問精詳。心思周到。辨證剴切。方案明通。言詞愜爽。近情舉止。落落大方者。雖向未謀面之人。亦一見而知爲良醫矣。其藥可服也。

七宜涼爽。霍亂痧脹。流行成疫。皆熱氣病氣。醞釀使然。故房中人勿太多。門窗勿閉。得氣有所泄也。蓋覆勿厚。總以病人不覺冷爲度。昧者不知。強加衣被。而致煩躁昏瞶者甚多也。如樓居者。必移榻清涼之所。勢劇者。宜鋪席于陰涼乾燥泥地上。臥之熱氣得土而自消也。凡見路途卒倒之人。縱無藥贈。但能移之

霍亂治法

九

陰處。卽是一服清涼散也。吐瀉穢濁。隨時掃除淨盡。毋使重觸病人。與旁人。醫來時尤宜加意。否則臭難嚮避。如何息心靜氣。以辨證耶。

八宜鎮靜。凡患急證。病人無不自危。旁人稍露張皇。病者逆謂必死。以致輕者重。而重者遂嚇殺矣。蓋人雖壽至百齡。未有不貪生長死者。此人之情也。故近情之醫。雖臨危證。非病人耳聾者。必不當面言凶。親友切勿交頭接耳。以增病人之懼。婦女更勿顰眉掩淚。以致弄假成真。

九宜汎愛。凡患急證。生死判乎呼吸。苟不速爲救治。病必轉入轉深。救治而少周詳。或致得而復失。骨肉則痛癢相關。毋庸勉

強最苦者貧老無依。經商旅賈。舟行寄廬。舉目無親。惟望鄰友多情。居停尚義。解囊出力。起此危疴。陰德無涯。定獲善報。十保胎孕。凡懷妊于夏月而陡患腹痛者。雖在臨盆之際。先須握其手而指尖不冷。撫其額而身不發熱者。方是將娩之疼。否則即是痧患。而痧藥類多。姑孕概勿輕試。余每以晚蠶砂及雪糝治之。無不立效。挾寒者。紫蘇砂仁。香附。橘紅之類。可用。設患霍亂重證。先取井底泥。傳心下及丹田。再用捲而未舒之嫩荷葉。焙乾五錢。蚌粉減半共研。新汲水入。密調服三錢。併塗腹上。名單胎散。若係寒霍亂。用伏龍肝研末。水和塗臍。方寸乾。即再塗。服藥尤須加慎。一切傷胎之品。均不可用。回陽膏亦不可貼。

霍亂治法

附妊娠藥禁

便產須知云。蟬。青蟹。水蛭。與。蟲。烏頭。附子。及。天雄。野葛。水銀。暨。巴豆。牛膝。薏苡。併。蜈蚣。三。枝。莖。諸。石。花。麝。香。大戟。蛇。蛻。黃。雌。雄。砥。石。火。芒。硝。大黃。牡。丹。桂。槐。花。子。牽。牛。皂。角。同。半。夏。不。忌。者。南。星。膽。製。陳。久。兼。通。草。瞿。麥。乾。薑。桃。仁。木。通。銅。砂。乾。漆。蟹。爪。甲。地。膽。茅。根。與。蟻。蟻。草。厚。朴。及。薇。銜。橫。根。茵。茹。葵。花。子。赤。箭。蘭。草。刺。蝟。皮。鬼。箭。紅。花。蘇。方。木。麥。蘗。常。山。莢。藜。蟬。錫。粉。礪。砂。紅。娘。子。硫。黃。石。蠶。其。蜘蛛。螻。蛄。衣。魚。兼。蟻。蟻。桑。螵。飛。生。及。椿。雞。牛。黃。犬。兔。驢。馬。肉。麝。蝦。蟻。蟻。與。龜。

濟齊微書云。甘遂。沒藥。破故紙。延胡。商陸。五靈脂。薑黃。葶藶。穿山甲。歸尾。靈仙。樟。續。隨。王。不。留。行。龜。膽。甲。麻。黃。川。椒。神。翅。伏。龍。肝。珍。珠。犀。角。車。前。子。赤。芍。丹。參。益。母。射。干。澤。瀉。澤。蘭。紫。草。鬱。金。土。瓜。根。滑。石。白。犀。所。至。此。雖。非。傷。胎。之。藥。然。係。行。輕。用。及。紫。葳。即。凌。霄。花。猛。厲。之。藥。皆。能。傷。胎。人。猶。知。之。如。薏。苡。茅。根。通。草。厚。朴。益。母。之。類。性。味。平。和。又。為。霍。亂。方。中。常。用。之。品。最。易。忽。略。不。可。不。加。意。也。

霍亂治法

十一產後丹。溪。一。代。宗。工。乃。謂。產。後。宜。大。補。氣。血。為。主。雖。有。別。證。從。未。治。之。景。岳。已。辨。其。非。矣。而。俗。傳。有。產。後。宜。溫。之。說。不。知。創。自。何。人。最。為。悖。謬。夫。產。後。陰。血。盡。脫。孤。陽。獨。立。臟。腑。如。焚。經。脈。如。沸。故。仲。聖。專。以。養。血。消。瘀。為。主。而。石。膏。竹。茹。亦。不。禁。用。若。夏。令。熱。產。慮。感。暑。痧。無。病。者。萬。勿。輕。嘗。藥。餌。不。但。生。化。湯。不。可。沾。唇。雖。沙。糖。酒。亦。須。禁。絕。設。有。腹。痛。未。審。是。否。兜。痧。惟。六。一。散。最。為。雙。關。妙。藥。若。明。係。痧。證。或。患。霍。亂。者。按。常。法。治。之。如。果。熱。熾。毒。深。不。妨。仍。用。涼。化。如。無。虛。象。勿。以。產。後。而。妄。投。補。藥。如。無。寒。證。勿。以。產。後。而。妄。施。熱。劑。魏。柳。洲。云。近。時。專。科。及。庸。手。遇。產。後。一。以。燥。熱。溫。補。為。事。殺。人。如。麻。故。治。產。後。之。痧。邪。霍。亂。者。尤。當。戒。戒。也。

十二善後。凡霍亂吐瀉皆止。腿筋已舒。始為平定。若暴感客邪。

而發者。即可向愈。口渴以陳米湯飲之。知機以熱蘆根熟見此。或煮綠豆。或符湯煮北方桂。燂之。必小溲清。舌苔淨。始可喫。粥飯。鮑魚。白鯊之類。油膩酒醴。甜食。新鮮補滯諸物。必解過堅。矢始可徐徐而進。切勿欲速。以致轉病。若因伏邪而發者。未必速愈。證勢雖平。尚多枝節。否則肢未全和。或熱不遽退。胸猶痞悶。若色不化。溺澀不行。此皆餘熱逗留。或治未盡善。亟宜清滌。餘邪。宜通氣道。勿以其不饑不食而認為吐瀉傷元。妄投補滯。勿以其神倦肢涼而疑作寒涼過度。妄進辛溫。良由深伏之邪。久匿而不能盡去也。仍宜以輕涼清肅之品。頻頻煎服。俾其疏瀹。自然水到渠成。待得知饑。然後以飲食如前。法消息之自愈。

霍亂治法

主

其果因過服寒涼而便澀不已者。必溺清不渴。可以資生丸調治之。方見四篇

此段皆名言也。因善後不得法誤事者甚多。須熟復初思食時。余嘗用鹽調藕粉。似亦頗妥。陳米湯亦不若綠豆湯為穩。謝城

乾霍亂痛止為平。若淨口和便堅溺澀為痊。飲食消息之法同上。

寒霍亂輕者得平即愈。但節飲食慎口腹可也。重者多兼正虛。一俟陽回熱藥不可再投。但宜平補元氣。如液傷口燥者。即須涼潤充津。蓋病或始于陽虛。而大下最能奪液。不知轉計。必墮

前功。飲食調理亦悉若色復淨而消息之可也。陽回之後熱劑者甚鮮。因過劑而誤事者亦時有之。此段語亦甚精當。謝城

守險

霍亂時行。須守險以杜侵擾。霍亂得愈。尤宜守險以防再來。昧者不知。從事符錄。以為排兵自衛之謀。良可慨已。縱恣如常。效彼開門揖盜之愚。尤可笑也。荷欲禦亂。略陳守險之法如左。一人烟稠密之區。疫癘時行。以地氣既熱。穢氣亦盛也。必湖池廣而水清。井泉多而甘冽。可藉以消弭幾分。否則必成燎原之勢。故為民上及有心有力之人。平日即宜留意。或疏濬河道。毋使積污。或廣鑿井泉。毋使飲濁。直可登民壽域。不僅默消疫癘。

霍亂治法

主

也。此越險守疆之事。為禦亂首策。非吾儕仰屋而談者。可以指揮而行也。

一當此流離播越之時。卜居最宜審慎。住房不論大小。必要開爽通氣。掃除潔淨。設不得已。而居市廛湫隘之區。亦可以人工斡旋。幾分稍留餘地。以為清路。毋使略無退步。甘于霉時受溼。暑令受熱。平日受穢。此人人可守之險也。無如貪夫徇財。愚夫忘害。恬嬉泄沓。漫無警省。迨揮霍撩亂。突如其來。手足無措矣。一昔范文正公每就寢。則思一日之食與所行之事。能相準否。雖朝齋暮鹽。貧不能自給。而每慨然憂天下之憂。以其志行磊落。足以紀綱人道。而豈腴然為飲食之人哉。嗚呼。此六十四字。

爲故人宜春袁蓮布衣跋余飲食譜之絕筆也。跋未竟。未便刊于譜。故列以爲霍亂守險之一策。因近人腹負者多。厚味脂毒。臟腑先以不清。故穢濁之邪易得而乘之。同氣相求。勢所必然之事。若能效法先賢。不徒爲飲食之人。以其餘資。量力而行。疏河鑿井。施藥救人。敘理暴露。掃除穢惡諸事。不但保身而杜病。吾聞積德可回天。不僅可禦霍亂也已。

一祖父家訓。不許供設神像。遵聖人敬而遠之也。余性尤不佞。佛生長錢塘。天竺山未嘗一到。雖食貧居賤。而最惡持齋之說。先慈聞而責之曰。兒自命通脫。何亦效迂儒口吻乎。夫澹泊自甘者。有幾人哉。雖以聖賢言行教之。其如從而勿改。何。蓋愚人

霍亂治法

五

必動之以禍福。惕之以報應。而始畏慕勉行也。故具不得已之苦心者。假神道以設教。創持齋之日期。誘而掖之。斡旋不少。試看疫癘流行之際。僧尼獨鮮死焉。此其助效也。余敬聽而識之。屢試不爽。益歎母訓之非謬。故夏月款客。惟用海味乾肉煎蝦之類。開或爲賓。託言茹素。亦藉以節主人之費。雖伎席優賜。曩時亦赴。但擇輕清者而食之。追憶生平。未患痧證。敢以此法。公諸同世。

一造酒麪者。必取諸草汁。以和米蘖而成。凡草初出之兩葉尖者。屬陽性烈而味辛。可以造麪。初出之兩葉圓者。屬陰性涼而味酸或苦。皆不中用也。故酒性純陽。大冷不冰。造酒之屋。木尙

漸腐。生物酒浸。皆能漸熟。不但能腐人腸也。然嚴寒之令。略飲可禦風寒。卒犯飛尸。溫服可祛陰氣。若縱飲無節。未有不致病者。又惟夏月爲尤甚。宋劉元城先生云。余初到南方。有一高僧教余。南方地熱而酒性亦熱。況嶺南烟障之地。更加以酒。必大發疾。故余過嶺。卽闔家斷飲。雖徧歷水土惡劣。他人必死之地。余闔家十口。皆無恙。今北歸十年矣。無一患障者。此其效也。蘇文忠公云。器之酒量無敵。今不復飲矣。觀此則妄人所謂酒可以辟障疫者。豈非夢謬。夫障疫皆是熱濁穢毒之氣所釀。同氣相求。感受甚易。且酒之淫熱久蓄于內。一旦因邪氣入之。而併爲一家。其勢必劇。其治較難。其愈不易。縱性耽麪。甘醉死而

霍亂治法

五

而不辭者。夏令必須戒飲。或不屈死于揮霍撩亂之中也。一願生之道。易經始發之曰。節飲食。孔子曰。食無求飽。應休理云。量腹節所受。陸放翁云。多壽祇緣餐飯少。隨園詩話云。不飽真爲卻病方。蓋饑飽勞逸。皆能致疾。而飽煖尤爲釀病之媒。故神農氏播穀之餘。卽收藥味。有熊氏垂裳之際。聿著方書。而世俗罕知。因強食致病者。不勝縷述。緣人身之氣。貴乎周流無滯。則濁降清升。雖感客邪。亦潛消默化。而不能留著爲病。惟過飽則胃氣壅塞。脾運艱遲。偶吸外邪。遂無出路。因而爲痧。脹成霍亂者最多。故夏令不但膏粱宜屏。雖飯食且然。尤無故喜服參藥。妄食膩滯之物。如龍眼蓮子。以圖補益。而窒塞其氣機。設

犯痧穢之邪。多致不收。今夏有諸醫余小坡進士。竄難來事。與余親家褚子耘茂才比屋而居。亦知醫。為人視病。歸。啖蓮子一錢。畢。即覺不舒。尋即吐瀉轉筋。欲請余診。而不及。以邪氣得補。無從宣泄。逼其深入。故告危如此之速。猶之賊來而自棄其險。閉城以待斃也。嘻。可悲已。

過飽不可。過饑亦不可。不飽非饑之謂。宜知之。謝城。

一。鰻鱺性熱助陽。隨性寒滋陰。然或有毒者。夏令更有蛇變者。尤勿輕嘗。即無毒者。其質味濃厚。膩滯難消。如吸外邪而誤食之。皆難救治。市脯尤覺穢濁。咸宜杜絕。因食鰻鱺而霍亂者。余見甚多。謝城。

霍亂治法

天

一。瓜果冰涼等物。雖能滌熱。過食驟食。既恐遏伏熱邪。不能泄越。又慮過度而反為所傷。宜節節為妙。若口不渴。汗不出。溺不赤者。諸冷食皆在所忌也。

一。冬夏衣被過煖。皆能致病。而夏月為尤甚。既因煖而致病矣。或又因病而反畏寒。以熱鬱于內。而氣不宜達也。再加蓋覆。則輕者重。而重者即死矣。竟有死已許久而旁人未知者。年來聞見甚多。此如開門揖寇。城已陷。或有尚在夢中而不覺者。可歎也已。亦勿過于貪涼。迎風沐浴。夜深露坐。兩至開窗。皆自棄其險。而招霍亂之來也。不可不戒。一。食井中。每交夏令。宜入白礬雄精之整塊者。解水毒而辟蛇。

也。水缸內宜浸石菖蒲根降香。

一天時潮蒸。室中宜焚大黃茵陳之類。亦可以解穢氣。或以艾搓為繩點之。亦佳。

一。用川椒研末。時塗鼻孔。則穢氣不吸入矣。如覺稍吸穢惡。即服玉樞丹數分。且宜稍忍饑。俾其即時解散。切勿遽食。尤忌補物。恐其助榮為虐。警姦細來而得內應也。

一。無論老少強弱之人。虛實寒熱之體。常以枇杷葉湯代茗。可杜一切外感時邪。此葉天士先生法也。見醫案存真。然必慎起居。節飲食。勿謂有葉先生法在。諸可廢弛也。

一。無論貧富。夏月宜供饌者。冬醃乾菜。蘆菔芹筍。鳧苡絲瓜。冬。

霍亂治法

天

瓜瓠。豇豆。紫菜。海帶。海蛇。大頭菜。白菜。薹菜。及綠豆。黃豆。所造諸物。人人可食。且無流弊。肉食者。鄙焉。知此味。嗚呼。苟能常嚴菜根。則百事可做。豈但性靈不為泯沒。足以禦揮霍撩亂之災乎。

揮霍撩亂。突如其來。集餽徵師。動需時日。莫若乘其初發。何難一擊而平。爰備載伐毛取噓。刮痺刺搨。急救諸事宜。于前復詳偵探策。應紀律守險諸機。要于後。雖婦豎一覽。咸知勦禦之方。既可各保身家。而厲氣莫能張其焰。或可不蹈兵馬過離邑破之諺也。故列治法第二。

隨息居重訂霍亂論第三醫案篇

海昌王士雄夢隱纂

鎮海陳亨春泉校

南鍼

張戴人曰。泰和間。余見廣濟院僧病霍亂。一方士用附子乾薑。同煎放冷服之。服訖嘔血而死。如此而死。必是暑證。誤用溫藥。害兄與附子同。頃合流鎮李彥直。中夜忽作吐瀉。自取理中丸服之。不得一誤。用者害不旋踵。醫至謂有食積。以巴豆藥三五丸下之。亦不動。至明而死。必有食積。何遂平李仲安。攜一僕。一個客至。偃城夜宿。邵輔之家。是夜僕逃。仲安覺其逃也。騎馬

霍亂醫案

與佃客往臨穎追之。時七月。天大熱。炎風如箭。埃塵漫天。至辰時而還。曾不及三時。往返百二十里。既不獲其人。復宿于邵氏齋。忽夜間聞呻吟之聲。但言救我。不知其誰也。執火尋之。乃仲安之佃客也。上吐下瀉。目上視。面不下。胸脇痛。不可動搖。口欠而脫。曰。四肢厥冷。此正風溼。喝三者俱合之證也。涼氣乘馬疾馳。更扶其壻。曾問余言。乃取六一散。以新汲水。到生薑調之。頓服半升。其人復吐。乃再調半升。令徐服之。良久方息。吐證服藥往徐服始。至明又飲數服。遂能起。生薑不煎。但到入新汲水中。而合法也。至明又飲數服。遂能起。生薑不煎。但到入新汲水中。而助火之弊。可為用藥之法。調養三日。平復。其勞瘁之傷。可為治法。

霍亂醫案

羅謙甫治一蒙古。因食酒肉。渣乳而患霍亂。從朝至午。精神昏憤。脈皆浮數。未去。按之無力。所傷之物已出矣。正氣即以新汲水調桂苓白朮散徐服之。妙。隨作地漿水。澄取清者一杯。再調服之。尤吐瀉遂止。次日微煩渴。與錢氏白朮散時服而愈。證如是而所傷之物已出。則知中氣傷殘。暑邪未解。故用補正清邪之治。凡虛人受暑而病。此者。即以此是案為法。可也。其理中四逆等方。皆治陰寒。致病非治暑也。此等界限。不清。亦何足以言醫耶。又治提舉公年近八十。六月間患霍亂吐利。昏冒終日。不省人事。暑邪脈洪。大有力。一息七八至。火勢頭熱如火。邪熱上僭。足冷如冰。非下虛也。半身不遂。胃氣大亂。不能牙關緊急。明之俗中風。遂以甘露散瀉熱。補氣安神。明加茯苓以分陰陽。冰水調

灌漸漸省事。而諸證悉去。後慎言語。虛證節飲食。諸病宜。無三日。以參朮調中藥。理正氣。十日後方平復。

汪石山治一人。年三十餘。形瘦弱。忽病上吐下瀉。水漿不入口。七日自分死矣。未服燥熱藥。診脈入至而數。曰。當夏而得是脈。暑邪深入也。提舉以八十年而脈入至此。人七日不吐瀉。不納水穀。邪氣自盛也。遂以人參白虎湯進半杯。良久復進一杯。徐進覺稍安。三服後減去石膏。知母。而人參漸次加至四五錢。操縱黃藥。橋皮。麥冬等。隨所兼病而佐使。制劑一月後平復。暑元傷之治。此案可法。一僕夫燕京人。縱酒飲食無節。疴霍亂吐瀉轉筋。煩渴幾殆。時

六七月淋雨。晝夜飲糖。瀉水數升而安。貧而無人服侍得飲此。是後生六子。起家致富。孫曾繞膝。壽至九秩。千金方云。輕者水。而終若富貴人患此。則每為溫補藥所誤也。人豈欺我哉。此偶合古方。余目擊其事。後路途中及六合縣。見一人服新汲井水良愈。或暑熱病渴喜飲。飲者但以新汲水。霍亂為然也。今人雖明知。其患熱而猶禁冷飲何耶。一人病霍亂。欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹疼痛。脈之沈伏如無。痛。每如此。乾霍亂也。急令鹽湯探吐。宿食痰涎。既許遂瀉。上竅得。自通。但得吐與六和湯愈。孫文垣治程氏子。先醉酒。後御色。其平素縱恣。大早四肢冷。胃。脘痛極。脈僅四至。或以鬱火治。投以寒涼。痛更甚。三日前所食。西瓜。吐出未化。已甚。乃翁以為陰證。傷寒。今人凡間病犯房事。之陰證。傷寒。輒以丁附。欲用附子。理中湯。不決。此翁頗虛心。逆。孫視之。面色青慘。叫痛而聲不揚。坐臥煩亂。是霍亂兼蛇厥證。也。先當止痛安蛇。後理霍亂。可免死也。遲則誤事矣。急用醋炒。五靈脂三錢。蒼朮一錢五分。烏梅三箇。川椒炮薑桂心各五分。水煎飲下。痛減大半。恣飲生冷。復傷于酒。更誤于寒。下午以大。腹皮藿香半夏橘皮山查茯苓五靈脂兩帖全安。仍以和中化。而愈。御色一端。略。不置。議詢可法也。江寧南治從叔于七月間得霍亂證。吐瀉轉筋。足冷多汗。囊縮。一醫以傷寒治之。增劇。庸工江診之。左右寸皆伏。不應。上下否。

伏而尺部極微。口渴欲飲冷水。足冷囊縮。似屬厥陰。口渴亦似。中陰。陰證。無轉筋。多汗。證乃以五苓散與之。此治傷寒霍亂。有表。若少陰。陰證。有汗。則死矣。乃以五苓散與之。證之方。江氏不察。泥。于熱。多欲飲水。句而誤也。此。覺稍定。向午猶渴。于厥陰。故口渴。欲飲。冷。非。傷。寒。也。而。以。五。苓。加。麥。冬。五。味。滑。石。投。之。始。知。為。暑。與。傷。寒。藥。湯。何。能。已。而。以。五。苓。加。麥。冬。五。味。滑。石。投。之。始。知。為。暑。五。味。酸。溫。不。足。藏。辜。而。更。以。黃。連。香。薷。飲。冷。進。一。服。俗。說。妄。用。五。味。不。知。服。後。何。如。次。早。脈。稍。出。按。之。無。根。且。人。脫。形。連。投。溫。香。薷。升。散。呢。或。手。足。逆。冷。飲。食。入。口。即。吐。等。藥。見。效。矣。大。便。宜。乎。如。是。為。炎。丹。田。八。九。壯。囊。縮。稍。舒。手。足。稍。溫。伏。熱。得。火。已。稍。不。禁。為。炎。丹。田。八。九。壯。囊。縮。稍。舒。手。足。稍。溫。伏。熱。得。火。已。繼。以。理。中。湯。二。三。服。知。今。者。也。氣。液。兩。傷。豈。可。再。服。此。湯。而。不。渴。猶。甚。咽。疼。熱。不。解。時。或。昏。沉。見。理。中。湯。不。是。虛。寒。也。乃。以。竹。葉。石。膏。湯。焦。頭。爛。投。之。而。愈。此。紫。江。氏。初。治。原。知。為。熱。止。因。泥。古。遂。清。補。兼。施。而。艾。灸。理。中。幾。至。潰。敗。幸。而。不。用。附。子。故。未。著。尚。能。挽。救。然。亦。危。矣。讀。者。鑒。諸。江。少。微。治。一。婦。人。六。月。中。旬。病。霍。亂。吐。瀉。轉。筋。一。醫。投。藿。香。正。氣。散。此。治。暑。涼。飲。冷。兼。寒。加。煩。躁。而。赤。揭。衣。臥。地。藿。香。正。氣。散。尚。不。可。誤。施。于。暑。熱。霍。亂。故。誤。投。附。桂。者。每。見。下。咽。即。昏。沉。厥。冷。再。遇。此。證。仍。以。此。法。投。之。至。老。不。悟。而。死。者。之。冤。亦。江。診。之。無。從。訴。此。余。之。所以。述。霍。亂。轉。筋。請。治。法。為。世。告。也。江。診。之。脈。虛。無。力。身。熱。引。飲。此。得。之。傷。暑。宜。辛。甘。大。寒。之。劑。瀉。其。火。熱。以。五。苓。散。加。滑。石。石。膏。吐。瀉。定。再。與。桂。苓。甘。露。飲。而。痊。暑。熱。為。虛。微。濕。弱。絛。結。細。乳。遲。以。熱。傷。氣。也。甚。至。隱。伏。不。應。指。或。兩。尺。絕。無。皆。邪。滯。經。絡。上。下。格。拒。使。然。不。可。誤。認。為。虛。寒。也。亦。有。脈。因。火。竭。而。反。洪。大。滑。數。異。常。者。此。霍。亂。所以。無。一。定。之。診。臨。病。極。宜。審。也。

陳三農治一婦。暑月方飯後。即飲水而睡。睡中心腹痛極。肢冷上過肘膝。欲吐利而不得吐利。疔痛垂死。六脈俱伏。令以藿香正氣散煎湯探吐。一吐減半。再吐而安。此停食飲冷。睡臥當風之劑。引吐又合機宜。不

必拘守懸湯一法也。
繆仲淳治高存之家僕婦患霍亂。以砂仁一兩炒研。鹽一撮。沸湯調。冷服一劑。愈。此治夏月食涼脾胃不和之輕證也。冬月傷冷物者。加吳茱萸。

張石頑云。一少年新婚。陡然腹痛。麻脊。醫通謂之番痧。即或令飲火酒半杯。此必疑其爲陰證也。而不知少年新昏最多火證。則火腹痛轉劇。旋增煩脹。身發紅點。清解必七。致流血而死。

與蘆根汁。解酒毒。得吐痛解。復有鼻衄。口燥。胸腹略見紅斑。分

便。續續與之。得大吐。汗出而痊。

葉天士治一人。霍亂後中氣大虛。肝風內動。心中空洞。身痛肢浮。用異功散加木瓜。薑棗。按此以培中制木之劑。而爲霍亂善後之治。最可法也。若見身痛肢浮。而誤用表散之品。則內風愈動。脾土重傷。因而致殆者多矣。夫霍亂固是中焦土病。而土病多由木侮。故雖治寒霍亂。必首察厥陰之動靜。儻其人肝陰素虧。內風暗動者。薑附等極宜慎用。即當用者。亦須妥爲駕馭。毋使過劑。設或無節。雖不似熱霍亂之立時殞命。亦必增劇而生。

枝節。試觀仲聖治厥陰下利之用白頭翁湯。其義自明。蓋厥陰雖當兩陰交盡。而具合晦朔之理。陰之初盡。即陽之初生。其本陰。其標熱。其體木。其用火。是以獨稱剛臟。而爵以將軍。顧名思義。可以悟其治矣。世有治肝氣。惟崇剛燥者。驟則變瘧。厥緩則成關格。人但知病之日深。而不知藥之所釀。併及之以爲醫家病家兩鑑焉。

懷抱奇治一男子。恣飲梅水。吐瀉無度。手足厥逆。面色慘晦。聲音不出。而脈沉伏。小水點滴不通。服藥入口。即吐。醫告技窮。余思梅味酸主收。故小便癃閉。而果得勝則敗。勝又香竄走竅。乃取麝半入臍中。半入鼻孔。病者即以手拂其鼻曰。此何物也。少

頃。小水大下。二三行。忽如醉而醒。夢而覺。越日索粥漸安。此無者。故但以敗果通竅。即能奏效。其巧思正不可及也。

童拭蘆治陳氏婦。盛夏病霍亂吐瀉。腹中疔痛。四肢厥冷。冷汗漉漉。轉筋戴眼。煩躁大渴。喜冷飲。飲已即吐。六脈皆伏。雖曰霍亂。實厥厥也。經云。大氣入臟。腹痛下注。可以致死。不可以致生。速宜救陽爲急。遲則腎陽絕矣。以四逆湯薑附各三錢。炙甘草。吳茱萸各一錢。木瓜四錢。煎成冷服。日夜連進三劑。四肢始和。危象皆退。口渴反喜沸湯。寒象始露。即于方中佐以生津存液之品。兩服而安。按此案論證用藥。皆有卓識。其真諦全在喜冷飲而飲已即吐。及服熱藥後反喜沸湯也。設能受冷飲者。即爲

內真熱而外假寒。然熱證亦有胸下格拒不通。雖喜冷飲飲已仍吐。必細細呷之始能受也。亦有痰涎內盛。雖渴而喜熱飲者。皆不可誤認爲寒也。故必辨舌苔之色澤。驗小水之有無。始無通情。案中未及尙欠周詳。且大氣入臟。非人人共患之疫。而疫氣流行之際。亦閒有此一證。故醫者必議病而用藥。毋執方以殺人是乃仁術。

倪姓患霍亂吐瀉。審知始不作渴。四肢不逆。脈不沉細。易治一證。醫用大順散兩帖。漸至于此。因見四逆。復加附子。脈證更劇。我多童曰。此病一誤再誤。命將殆矣。若果屬寒。投熱病已。今反四逆。脈轉沉細。欲伏乃釀成熱深厥深。與熱邪傳入厥陰者何異。

霍亂醫案

七

錢證即以竹葉石膏湯入參易西洋參。是加黃連滑石兩劑而中肯。同時有陸姓患此。醫用回陽之劑。日夜兼進。豈真欲其速死哉。紙上談兵讀書無眼者往往如是。不厭逆煩躁日增。病人欲得冷水。禁絕不與。可恨甚。至病者自起。拾地上痰涎以解渴。可憐。遷延旬日而死。能延旬日則欲得冷水。噫。即使真屬陰寒。陽回躁渴如是。熱時若能轉計。猶可活也。涼藥和之。病亦立起。不學無術。曷勝浩歎。

涼藥和之妙理未經人道

謝賦

張氏女。夏月患霍亂。醫用薑附霍朴茶連等藥。嘔吐雖止。腹痛不已。而痢五色。至第八日。童診脈細數。沉部有力。兩目暈翳。舌絳。脣紅。胸膈煩懣。口渴引飲。是暑穢之毒擾亂中宮。而病霍亂。

苦熱雖能開鬱止嘔。畢竟反助邪勢。致變五色毒痢。此暑毒而兼濕邪。故僅變五色毒痢。若與子和桂苓甘露飲加黃連銀花無溼而暑毒重者。早不救矣。黑豆兩服。驚退而諸恙遞減。胃亦稍甦。因畏藥不肯再服。余謂餘邪未淨。雷而不去。戕害臟腑。必轉他病。乃與三豆湯加甘草頻飲而愈。

湯芷卿曰。常州伍某素壯健。方啖飯。忽呼痛倒地。云胸膈如刀割。羣醫莫治。問三日。慨慨待斃矣。一老人過。問病情。令磨陳墨汁與啖。痛立止。病如失。因問是何證也。曰。記少時鄰人患病。類此一老醫以此法治愈。云誤食天絲毒也。想墨汁無害。故令試之。不料其果合耳。此證雖罕。設有之人必以爲乾霍亂耳。故宋之以廣聞見。

霍亂醫案

八

固始有人于元旦食湯圓訖。方出門賀歲。忽腹如火燒痛。不可忍。量絕仆地。移時稍蘇。而號痛聲徹四鄰。諸醫皆云。脈細如絲。不治。痛極脈微。越日門外來一丐僧。家人辭以有病。僧云。何不問我家人。苦無策。姑令人僧一望。即曰。是誤食蛇精也。神乎。彼矣。醫書而不識。一證自命。爲儒醫者。人因信其學問。而併信其醫。彼此質實。雖日殺人而不悔。宜乎時人逸士之晦跡以避也。可慨。于破囊中取藥一丸。以水研灌。移時病者起。嘔如雀卵者數枚。僧云。未也。復嘔穢狼籍。出一物如雞子大。僧曰。是矣。剖視乃血裹中蟠一小蛇。見人遽動作勢上下。病已若失。舉家驚服。我亦叩其所以。云多年陳穀蛇交其上。餘澁黏著。誤入腹中。乃成此物。少停即洞胸腹出矣。僧徑裹蛇而去。按揮霍撩亂已不。

易平必辨陰陽。始能奏績。此證雖非霍亂而病來迅疾。饑似食滯之乾霍亂。且證勢之撩亂較霍亂爲尤亂也。苟無破敵之才。徒有虛名之學。焉能平此大亂哉。用藥如用兵。苟僥有之矣。采此以爲撥亂反正者。告勿以資格用人也。凡腹中卒然大痛。在飲食後而無別證可憑者。多係誤食毒物。重用紫金丹或玉樞丹。研灌似亦有效。

楊素問治其仲郎王子夏患乾霍亂。身熱不渴。口燥無苔。六脈俱伏。痛在胃脘。連及胸脇。勢甚洶涌。先與地漿一碗。勢少定。少頃復作。因徑投大承氣湯一帖。其痛卽下行至臍間。又一帖痛又下行。伏于少腹右角。按之則痛。不按則與平人無異。起病至

此已歷周時。思食甚急。乃以綠豆煮粥與之。食後一切如常。惟少腹右角按之仍有小塊隱隱作痛。遂重用當歸枸杞裏仁。佐以桃仁紅花。少加牛膝以導之。服一時許。腹中汨汨有聲。下紫黑血一塊。若五寸許。而少腹之痛塊若失。此病治法。原出一時臆見。然竟以獲痊。特錄出質之半疑。不知以爲何如。按霍亂證因于暑熱者多。故感受稍重。極易入營。古人刺以泄血及內服益母湯藕汁童溺。皆所以治營分之邪也。楊公子舌燥無苔而不渴。痛又及脇。必平日偶有絡傷未覺。乃邪遂乘取而入也。承氣之硝黃。豈是血藥。氣行則瘀降。故痛得漸下。迫塊在而按之始痛。且知饑能食。益見氣分之病已瀉。而血分之邪尙匿。毋庸

承氣之直攻。改從濡化而曲導。操縱有法。余服其手眼之超。景岳謂飲食下行之道。必由少腹下右角而後出于廣腸。自誇閱歷而知。古人並未言及。蓋渠嘗治一人食麪角雜投。巴豆大黃而不效也。魏柳洲曰。就此觀之。景岳平生臨證。遺憾多矣。夫麪角由胃入腸。既至少腹之角。豈能作痛如是而又如拳如卵。必其人素有痼病。偶因食麪而發。或兼當日之房勞。遂乃決張如是。故推蕩之藥不應。得木香火酒一派辛熱香風而痛始止也。至謂食由少腹下右角而後出廣腸。更堪捧腹。經謂大小腸皆盤屈十六曲。則左旋右折可知。豈如筒如袋而直下乎。噫。按楊公子少腹右角之痛。設非乃翁卓識。

醫必誤認食滯。特附錄魏語以廣其義。併爲崇尙景岳者告。山陰田雪帆明經。晉元著時行霍亂指迷。辨正世俗所稱弔腳痧一證。以爲此真寒直中厥陰肝經。卽霍亂筋是也。初起先腹痛或不痛。瀉利清水頃刻數十次。少者十餘次。未幾卽手足攣攣。嘔逆口渴。厥逆聲嘶。脈微欲絕。舌短目眶陷睛上視。手足青紫色或偏身青筋硬凸如索。汗出脈絕。急者且發多死。緩者二三日或五六日而死。世醫或認爲暑濕。妄投涼瀉。或認爲痧氣。妄投痧藥。鮮有不斃。宜用當歸四逆加吳茱萸生薑湯水煎。冷服。輕者二三劑卽愈。重者多服幾劑立可回生。真神方也。如嘔者加製半夏三錢。淡乾薑一錢。口渴添飲黃黃加薑汁炒川

連五分爲反佐。經所謂熱因寒用也。腹中絞痛。名轉筋入腹。加酒炒木瓜三錢。手足冷過肘膝。色見青紫。加製附子三錢。此證種種皆肝經見證耳。緣坎中真陽爲邪寒所逼。因之外越。所謂內真寒而外假熱也。但以脈辨之。自無遊移矣。

寒犯厥陰而爲霍亂轉筋者。容或有之。豈可以概論時行之證耶。果係寒犯厥陰而吐利并出。則當用吳茱萸湯加減。或烏梅丸法。不當用當歸四逆加吳茱萸生薑湯。以當歸四逆本桂枝湯加當歸通草細辛。通血脈以疏肌表。非汗出脈絕之證。所可輕嘗。至脈不可憑。必以口渴舌黃喜冷飲爲辨。真熱假寒之確據。竟敢顛倒其說。曲爲妄解。何欺人之太甚哉。

書生紙上談兵。好發想當然之議論。惑世誣民。大率類是不可不辨也。故附錄于此。

夢影

道光元年冬。金展思文念祖父之勞勩。命余佐理。繼務于婺州之孝順街。公餘之暇。輒披覽醫書。焚膏繼晷。樂此不疲。三年夏。開主政周光遠先生年二十七。體極腴。登廁後忽體冷自汗。唇白音低。僉以爲痧。欲進開竅等藥。時余年十七。竊握其臂。以診之。脈已微。與欲死。因力排衆議。曰。此陽氣之欲脫。非痧邪之內閉。再投香散。殆速其危也。人皆以童子何知而笑之。幸先生聞而首肯者。再倉卒不及購藥。余適有琴仙妹所貽三年女佩。

藿一塊。約重四五錢。急煎而灌之。卽安。後用培補。率以參耆朮草爲主。蓋陽氣偏虛之體也。先生甚德之。視余若弟。且逢人說項。遂以浪得虛名。癸卯爲余刊治案。余愧無以報也。先生年五十歲無疾而逝。猶是陽虛暴脫耳。無子。一女適蔡氏。其夫人年踰六旬。杭垣再陷後。未知下落。無從採訪。追錄是案。抱憾滋深。又癸卯冬至前一日。管叔軒大中丞忽于溺後汗淋氣短。色奪言微。余適在靈隱送葬。三遺弁丁速余至署。已痧藥進之屢矣。真可挽回。凡陽氣極虛之人。便溺後忽然欲脫。是急宜參附回陽之證。誤認爲痧。多致決裂。治霍亂者。須明辨之。

霍亂醫案

七

惟指心抓舌而已。人皆以爲乾霍亂。余謂乾霍亂何至遽不能言。且欲抓舌。似中毒耳。或云同僮數人。何彼中毒。然刮之。焯之。皆不驗。余以資夜無從購藥。令取綠豆二升。急火煎清湯。澄冷灌之。果愈。越日詢之。始言久患痺痛。因餌草頭藥一服。下嚥後卽心悶。不可耐。舌麻不能言。而旁人不知也。

一伎自幼喜食蠶蛹。及并遊上江者數年。久不食此。二十二歲旋杭。得與家人暢啖。正歡笑間。腹痛陡作。隨地亂滾。或以爲絞腸痧。亟拉余勘之。脈色皆和。非痧非食也。若以爲中毒。則其食老少皆無恙。諦思之。雖以椒蒜炙熟。與人同啖。恐其中有一二枚。或異者。亦未可知。蠶動物也。與馬同氣。其性熱。更益以椒蒜。

之辛姑仿中馬肉毒例治之。命吸人乳。果飲下即安。

己丑五月。天氣驟熱。先慈陡患霍亂。肢冷自汗。脈微苔白。腹大痛。欲重按。是中虛有素。因熱而受寒侵也。進大劑理中湯。加桂枝白芍。覆杯而愈。此所謂舍時從證也。

丁酉八九月間。杭州盛行霍亂轉筋之證。有沈氏婦者。夜深患此。繼即音啞。厥逆比曉。其夫皇皇求治。余診其脈。絃細以澀。兩尺如無。口極渴而沾飲即吐。不已。足腓堅硬如石。轉時痛楚欲絕。乃暑溼內伏。阻塞氣機。宣降無權。亂而上逆也。為仿金匱雞矢白散例。而處蠶矢湯一方。令以陰陽水煎成。候涼徐服。此藥入口竟不吐。外以燒酒令人用力摩擦其轉筋堅硬之處。既及

霍亂醫案

三

時許。鬱熱散而筋結始爽。再以鹽鹵浸之。遂不轉筋。漸漸止。哺時復與前藥半劑。夜得安寐。次日但覺困極耳。與致和湯數服而痊。後治相類者多人。悉以是法出入。獲效。惟誤服附子者。最難救療。

此證火酒摩之時。許鬱熱散而筋漸舒。則轉筋雖因火熾。必兼外寒鬱遏。而始反戾也。大抵霍亂寒熱相搏者多。雖知其為寒為熱。亦須反佐以治。蓋即此理。謝城

鄭鳳梧年六十餘。秋間患霍亂。寒厥逆。煩悶躁擾。口不甚渴。或以為寒。余察脈細欲伏。苔白而厚。乃暑溼內蘊。未化也。燃犀之照。庶不為病所蒙。因制燃照湯。與之一飲而

皆退。脈起而吐瀉漸止。隨以清滌法而愈。

一貴婦年少體瘦。初秋患霍亂轉筋。舌絳目赤。大渴似冷。脈左絃強而右滑大。此肝胃之火素盛。而熱復侵營也。以白虎湯去米草。加生地。蒲公英。益母草。黃蘗。木瓜。絲瓜。絡薏。以二劑。知二劑已。丹溪云。轉筋由于血熱。此證是矣。

一丁姓者患霍亂。苔色白薄而不渴。但覺口中黏膩。彼自知醫。欲從寒溼治。余曰。中焦原有寒溼。所以不渴。然而黏膩。豈非暑入而釀其溼為熱乎。以胃苓湯去甘朮。加苡仁。川連。半夏。枇杷葉。二劑而瘳。

霍亂醫案

十四

錢某患霍亂。自汗肢冷。脈無。平日食涼飲冷。人皆謂寒證。欲用大劑熱藥。余曰。苔雖白。然厚而邊絳。且渴甚。頭大痛。不可因寒涼致病。而竟不察其有暑熱之伏也。遂以五苓去朮。加黃連。厚朴。黃芩。竹筴。木瓜。扁豆。服後脈稍出。汗漸收。吐利亦緩。即去肉桂。加桂枝。滑石。甘草。頭痛吐利皆止。苔色轉黃。隨用清暑和中而愈。

一少年體肥。畏熱。因酷暑。午餐酒肉後。以席鋪輒地而臥。覺即飽。啖西瓜。至晚覺頭重惡寒。夜分吐瀉大作。四肢拘急。汗冷息微。時時發躁。黎明連余勘之。脈沉弱。予漿水散。加吳茱萸。厚朴。投之即瘳。改授厚朴。生薑。半夏。甘草。人參湯。數服而愈。陸叟年七十餘。仲秋患霍亂。自服單方二三日。嘔吐雖已。利猶

不止。且頻頻作嘔。聲不甚揚。面赤目閉。小便不通。醫云。高年戴陽證。原不治。且延已數日。縱投大劑回陽。亦恐不及。余視之。脈雖虛。與並無脫象。况舌赤而乾。利下臭惡。氣分伏暑。業擬及營。慮其絡閉神昏。胡可再投熱劑。問所煎之藥。桂氣撲鼻。試之必死。迫令將藥傾潑。遂以紫雪三分。用竹茹。枇杷葉。通草。升參。連翹。石膏。蒲枯。梗黃。芩。蘆根。煎湯。候涼調而徐服。次日復診。目開。噦止。小溲稍行。于前方裁紫雪。加石斛。苡仁。服二劑。利減。能啜米飲矣。隨用致和湯十餘服而瘳。

霍亂醫案

主

微欲絕。亟宜峻補。遲恐無濟也。予東洋參。龍牡。耆朮。木瓜。扁豆。茯苓。石。英。酒炒。白芍。橘皮。為劑。四服而痊。

新產後用參耆大補。而又當盛夏之時。非有真知灼見者。不能也。誠以天下之病。千變萬化。原無一定之治。奈耳食之徒。惟知執死方以治活病。豈非造孽無窮。亦何苦人人皆欲為醫。而自取罪戾耶。錢鼎周錄光遠

此證正惟產後放膽參耆。猶人所能及。須看其餘藥。一一合拍。蓋得效。不僅在參耆也。至此方可云峻補。然慎服補劑者。必嫌其輕。加鹿角。五味等。必貽害矣。古來多少佳方。為妄人加減貽害者。何限。謝城

王某久患吐血。體極孱弱。沈琴癡拉余治之。甫得漸愈。乃庚子夏。酷熱之時。陡患霍亂。轉筋。大汗如雨。一息如絲。人皆謂無生理矣。余不忍輕棄。勉用西洋參。枇杷葉。龍牡。蠶砂。木瓜。扁豆。苡仁。滑石。桑葉。石斛。豆卷。地漿。煎服之。良愈。調理旬日。仍服滋補。以治宿恙。

倡女譚金。年二十七。患時疫。頗危。余為治痊矣。忽又求診。云患急痧。及察其脈。甚細。而按之緊數。神極委頓。吁吁而喘。泛泛欲嘔。眉鎖春山。淚含秋水。腮紅腹痛。舌潤口和。肢楚欲捶。指尖不冷。似房勞太過。寒襲奇經之男。勞復也。然大病方瘳。或不因是知其性情通脫。因微詢曰。夜來勿過勞乎。渠謂以君善治。隱曲。

霍亂醫案

主

敢爾乞憐。既得其情。但求援手。余聞而矜之。遂以胡桃肉。破故紙。龍牡。鹿角。霜。菟絲。覆盆。枸杞。茯苓。小茴。當歸。非子。為方。一劑。知二劑已。若實貿然。竟作乾霍亂治。當何如耶。乾霍亂而誤投此法。又當何如耶。

臨證如神。敘證如繪。佛心仙手。其言藹然。而一片靈光。傳之紙上。效驗不易。洵是天才。仁和胡耀會榮甫

戚姬者。年六十餘矣。自幼備食于杭州黃運泉家。忠勤敏幹。老而彌甚。主僕之誼。勝于親戚也。壬寅秋。患霍亂。轉筋。余視之。暑也。投蠶矢湯兩服而瘳。三日後。忽倦臥。不能反側。氣少。不能語。言不食不飲。運泉惶懼。就近邀一老醫診之。云為霍亂。皆屬于。

寒且昏沉欲脫。定附子理中湯一方。連泉知藥烈。不敢遽投。商之王君安伯。安伯云。且勿服也。若謂寒證。則前日之藥下。嘔即斃。吐瀉安能漸止乎。連泉大悟。仍著人飛刺招余往勘。余曰。此高年之體。元氣隨吐瀉而虛。治宜用補。第餘暑未清。熱藥在所禁耳。若在孟浪之家。必以前之涼藥為未當。今日溫補為極。是縱下嘔不及救。亦惟歸罪于前手寒涼之誤也。設初起即誤死于溫補。而舉世亦但知霍亂轉筋是危險之病。從無一人知此證有陰陽之異。治法有寒熱之殊。而一正其得失者。况一老年僕媼。非賢主人亦焉肯如是之悉心訪治乎。此病之所以不易治而醫之所以不可為也。今連泉見輩附而生疑。安伯察病機之已轉。主人惺惺而心虛。客亦多才而有識。二美相濟。遂使病者跳出鬼門關。醫者卸脫无妄罪。幸矣幸矣。乃以高麗參麥冬。知母。萎蕤。木瓜。扁豆。石斛。白芍。苡仁。甘草。茯苓等服六劑。始能言動。漸進飲食。調理月餘而健。璽齋謂余云。此餘熱未清。正氣大虛者之治法。更有不因虛而餘焰復燃者。須用煉雄升治之。

是證以半癡之學問。連泉之厚德。安伯之見識。三美相濟。始能起九死于一生。世之執死方治活病。視僕婢如草芥。不分皂白。信口雌黃者。讀此能無愧死耶。光遠

屈光遠先生歸杭定省。七月十八夜患霍亂轉筋甚劇。倉卒開

此寒霍亂也

誤服青麟丸。錢前勢益甚。侵曉召余診。脈微弱如無。目陷汗出肢冷。音啞肉脫。危象畢呈。藥恐遲滯。請其太夫人先濃煎參湯。亟為接續。隨以參朮苓芍附桂乾薑局豆木瓜苡仁連實為方。終劑即各證皆減。蓋氣分偏虛之體。不禁吐瀉之泄。每誤創苦寒。微陽欲絕。故以真武理中合法。以復脾腎之陽。詰朝再視。脈起肢和。即裁附桂乾薑加黃耆石斛。服旬日全愈。凡吐瀉甚而津液傷。筋失其養。則為之轉。故治轉筋者。最要顧其津液。若陽既回而再投剛烈。則津液不能復而內風動矣。此寒霍亂之用附桂。亦貴有權衡而不可漫無節制。致墮前功也。余此番之病。危同朝露。若非半癡不能救。嘗聞張柳吟先生云。但使病者聽半癡論病之無微不入。用藥之無處不到。源源本本。信筆成章。已覺疾瘳過半。古云微愈頭風。良有以也。光遠

案中議論極精微。凡用藥皆宜具此權衡。方無過當之弊。否則藥雖中病。而服之不止。反受其害。不但熱藥爾也。定州楊照家素

霍亂之霍。即霍疾之義。謂亂之最速者也。嘗見體素豐腴之人。一病半日。僅存皮骨。其傷人之速可知。蓋霍亂脾土先傷。脾主肌肉也。謝城

陳藝圃亦知醫。其室人于仲秋患霍亂轉筋。自診以為寒也。投

全在口苦而
渴四字分別
寒熱仍係熱
熱而死者亦
矣哉

狂督不安
即是熱象

熱劑勢益甚。招朱叔亭視之。亦同乎主人之見也。病尤劇。乃延余勘。曰此寒為外束之新邪。熱是內伏之真病。口苦而渴。蓋附不可投矣。與河間法人皆不信。再與他醫商之。仍用熱劑。卒至口鼻出血而死。

霍亂一證。近來時有。而醫皆不甚識得清楚。死于誤治者極多。半癡特著專論。辨析簡當。實今日醫家首要之書。以其切于時用。不可不亟為熟讀而研究也。光遠

甲辰五月下旬。天即酷熱異常。道路卒死者甚多。有腹痛者。有不痛者。人率以香燥痧丸投之。輒無效。蓋香燥反以益熱。而此證並非陰寒溼毒之邪。即古所謂中暈。也不出戶庭之人。亦有

霍亂醫案

九

病此者。必其人陰分素虧。內熱較甚。或居處飲食之失宜也。往往延醫不及。醫多不識其病。雖死身不遽冷。亦有口鼻流血者。是暑從吸入。直犯心臟也。時余居錢塘之髦兒橋。嘗稟先慈令家人慎起居。薄滋味。乃六月初二日午。餘後季傑弟婦腹忽微痛。平日食涼。自謂受寒也。私囑女僕沽燒酒飲之。即狂督不安。先慈知之。命僕從四路速余。曰甫映也。病者已口鼻出血死矣。其時新產婦人死者尤多。以陰血大去。暑熱易侵。而味者不知因時制宜。尚局其窗戶。羈以帘幃。環侍多人。飲以糖酒。故也。粗工亦不察。天時人稟之不齊。動輒生化湯。雖熱象已顯。猶誤信產後宜溫之俗說。而不知因證制方之活法。以致覆杯而斃。

一散
甘和
中果
妙品

者比比。或問當此熱地如燭。惡露不行而腹痛者。生化湯既不可服。宜用何方。余謂六一散最佳。既行瘀血。又能清熱也。設暑熱重感。雖石膏犀角對證皆為良藥。古人何嘗禁用。余案中治愈諸條。皆可參閱。然難與淺人言也。

盤頭港姚氏婦。妊已臨月。腹中陡痛。家人謂其欲娩。急煎參湯。以助其力。服後痛益甚。忙喚穩婆至。婦已渾身赤斑。喘逆昏狂。始知受暑。頃刻云亡。寶祐坊曹氏婦。亦懷妊臨月。腹痛。家人以為將產而煎參湯。迨湯成。痛已止。察其情景。知不即娩。然炎威甚烈。參湯久存。欲壞其姑云。婦既未晚。豈可服參以滯胎氣。我體素弱。常服補劑。參湯定亦相宜。遂飲之。甫下嚥。即覺氣悶。躁

霍亂醫案

十

胎前因
直洋
陰而產
以故

擾要時危。殆踰刻而終。後丙午壬子丙辰皆酷熱。傷人不勝。述古人以燥熱為暑。故曰流金燄石。况人非金石之質乎。惜世人多不察耳。不但酷暑時胎前產後之腹痛。當細審其有無別故也。

溫補宜
通所
清暑
極品

潘紅茶方伯之孫翼廷。館于外氏。酷熱異常。因啜冷石花一碗。遂腹痛痞悶。四肢漸冷。上過肘膝。脈伏自汗。神困嬾言。方某診謂陽虛陰暑。脫陷在即。用大劑薑附丁桂以回陽。病者聞之。益形銛慄。其叔岳許杏書茂才。駭難主藥。適族人許芷卿茂才過。彼遂與商之。芷卿云。此藥豈容輕試。而病象甚危。必延半癡。決之時已乙夜。余往視。面色垢滯。舌膩唇紅。是既受暑熱。驟為冷

飲冰伏火氣不能轉旋故肢冷脈伏二便不行所謂閉證也何脫之云亟取六一散一兩以淡鹽湯攪之澄去滓調下紫雪一錢翼日再診脈見痛獨潮行肢熱口乾舌絳暑象畢呈化而爲瘧與多劑白虎法而痊丙午舉于鄉查書多才尚義與余稱莫逆庚申春聞其歸賊而死嗚呼榮矣

認證既確治法用辛香以通冰伏之氣用意又極精妙真可爲萬世法程素問

室人徐氏素無病胃亦強且善作勞丙午八月朔夜猶燈下鍼稍伴余勘書夜分忽瀉二次晨起爲余梳髮未畢又瀉一次因診之脈七至而細促不耐按略無病苦此脈病人不病始不始

霍亂醫案

王

于今日不可救藥也未便明言即令安臥密聚先慈函致乃兄友璠請醫商治既而瀉頗緩且食山東掛麪一小碗先慈謂余太矜持矣余方躊躇麪即吐出灌以參藥亦不受瀉較緊午刻醫來亦云無法然尙能以乳哺女而既吸之後乳即痛而不起矣形亦漸削汗亦漸多脈亦漸脫音亦漸嘶戊刻遠逝斯人也性極賢淑且隔屏一聽即知客之賢否一旦抱此絕證知者無不悼惜乃中氣卒然潰散絕無僅有之候也

戊申秋仲張春橋令弟陡患腹痛適飽啖羊肉麪條之後初作痧治繼作食治痛愈甚而大渴然啜飲輒吐二便不行又作寒結治其痛益加呻吟欲絕已交四日余診脈絃數苔乾微黃按

腹不堅非痧非食特肝火鬱而不宣耳以海蛇一片鳧茛八兩煎至蛇煇頻瀉果不吐將餘汁煎冠連節棟知苓延胡旋覆柿蒂枇杷葉爲劑吞當歸龍薈丸投已即洩行痛減次日更衣不勞餘藥而瘳

朱留耕忽于飽食後大吐而厥冷汗息微厥甫回而腹痛異常乃翁湘槎以爲急痧霍亂之候也速余往勘脈至絃緩口極苦渴二便不行乃痰滯而熱伏厥陰肝氣無從疎泄也予雪蘂黃連冠棟旋節橋核元胡從容爲劑加蘆朮汁和服一劑痛減再服便行而愈

痧證霍亂挾食者必先去食傷寒亦然秦氏論之詳矣然竟

霍亂醫案

王

有病始飽食之餘初非因食爲患者半擬嘗云既無枵腹待病之理豈可專以攻消爲治故臨證必審問慎思而明辨之庶免顛預貽誤之弊右二案病皆起于食後朱證已得大吐不從食治人或能之張證不吐不瀉腹痛日甚雖明眼臨之不免眩惑乃半癰獨以非痧非食斷竟投七果瘥已非人所能及矣余門人沈南臺癸丑冬患病亦啖羊肉麪條而起勢瀕于危得半癰治愈至四十餘日始更衣則尤奇也用藥如用兵豈徒讀父書者之可爲哉仁和趙夢齡菊齋

陳樞年已七旬辛亥秋患霍亂轉筋甚危亟延余診已目陷形消肢冷音嘶脈伏無瀉口渴汗多腹痛苦黃自欲投井因先取

西瓜汁命與恣飲。方用石膏知母麥冬黃芩連竹茹木瓜威靈仙略佐細辛分許煎成徐服覆杯而瘥。

醫者能知少加細辛之何故則可以言醫矣。素園

此方得效可見辨證之的若無汗而渴者又當別論。謝城

姊丈李華甫繼室。陡患霍亂而兼溺血如注。頭疼如劈。自汗息微勢極危殆。速余診視。脈甚絃駛。此肝火內熾暑熱外侵。以犀角木通滑石梔子竹茹。以銀花茅根菊葉為大劑。和入藕汁。送當歸龍薈丸而吐瀉即已。溺血亦減。惟小溲時頭猶大痛。必使人緊抱其頭。重擎其巔。始可略耐。尚是風陽僭極。肺胃不清。也以葦莖湯去桃仁加百合白微元參小薊蒲公英竹葉西瓜

霍亂醫案

五

翠衣蓮子心為方。和入童溺。仍吞龍薈丸。服旬日全愈。

陳楚珍仲媳。陡患霍亂。云昨晚曾食冷魚。夜分病作。想因寒致病也。然臍間貼以回陽膏而不效。故敢求診。余按脈滑數右甚。口渴苔黃。令揣胸下。果堅硬而痛。曰吐瀉雖多。食尚戀膈。非寒證也。回陽膏亟宜揭去。以葶藶蘇連芩桔茹牛海蛇蘆煎為劑。一服而瘳。

婦兄吳某園。癸丑仲夏。陡患發熱嘔吐。莖縮腹痛。亟招余診。脈絃更而數。苔色黃膩。宜清厥陰蘊熱。非痧也。予棟茹連斛梔葉銀花通草絲瓜絡為方。一劑知。數劑愈。

沈峻揚令妹。年踰五旬。體極瘦弱。始則數夜不能眠。忽一日目

張不能開。淚則常流。口開不能閉。舌不能伸。語難出聲。飲不下。噤足冷便秘。筋癆而疼。身梗不柔。胸膈板悶。或謂暑痧重感。慮即慮脫。余視之。苔黃不渴。脈來絃細。更濕。重按如無。然神氣不昏。身不發熱。非暑痧也。二便艱澀。咽膈阻悶。非脫證也。殆由情志鬱結。怒木直升。痰亦隨之堵塞。華蓋故治節不行。脈道不利也。但宜宣肺氣行自愈。以紫苑白前兜鈴射干菖蒲枇杷葉絲瓜絡白豆蔻為方。一劑知。四劑愈。

證者證也。如斷案之有證據也。然證有真有偽。有似是而非。以致恆為所眩。如此案辨暑脫。則得其證矣。素園

霍亂醫案

五

蔣敬堂令堂。年七十四。陡患嘔瀉。身熱腹痛。神思不清。或以為霍亂。或慮其虛脫。迎余診之。脈微弱而數。曰暑脈自虛。不可以高年而畏脫。辛散痧藥。則不免耗傷其津液。爰定芩連滑斛。銀花竹葉橘皮枇杷葉之方。冬瓜湯煎。一劑而熱退神清。再劑霍然。敬堂慨多情。知醫施藥。余契友也。庚申春。聞其爭先拒賊。竟以被戕惜哉。

徐德生家一婢。年十七矣。陡患腹痛。稍一言動。則痛不可支。以為急痧。中惡。徧治不應。飛請余往。向以丹雄雞強伏其心下。然神色如常。並不吐瀉。脈來牢澀。苔色膩黃。乃多食酸甘而汎阻也。詢之果然。以桃仁紅花生蒲黃靈脂香附延胡芍藥海蛇蘆

腹爲方。送龍膏丸遂愈。

陳詰堂令郎子堂。甲寅春連日勞瘁奔馳之後。忽然大便自遺。並非瀉瀉。繼言腹痛。俄即倦臥不醒。及喚醒。仍言腹痛。隨又沉沉睡去。或以爲痧。或以爲虛。邀余決之。身不發熱。二便不行。舌無苔而渴。脈眩澀不調。非痧非虛。乃事多謀慮而肝鬱。饑飽勞瘁而脾困。因而食滯于中也。予積枳橘半查麴。服棟元胡海蛇。服二劑。痛移臍下。稍覺知饑。是食滯下行矣。去查麴加芎芩。服一劑。更衣而愈。

此證不難于認食滯。而難于認肝鬱。且當勞倦後見嗜臥證。不以爲痧。必以爲虛。而兼用參朮以顧脾胃。如此則肝愈不

霍亂醫案

五

舒而變證作矣。半癡用藥至輕而奏效至捷。良由手眼雙絕。素問

余嘗問半癡曰。既肝鬱于土而食不下行矣。何以乾矢自遺而不覺乎。半癡謂胃與大腸原一氣相貫。惟其食滯于胃而不化。似與大腸氣不相貫。故廣腸宿糞出而不覺。經云中氣不足。洩便爲之變。是亦變也。所謂不足者。非言中氣虛也。以中氣爲病所阻。則不足于降濁升清之職。故洩便爲之改常也。余聞而折服。其善讀古書。宜乎臨證之神明變化。令人莫測也。因思霍亂之吐瀉無度。乾霍亂之便秘不行。皆變也。皆中氣爲病所阻。而不足于降濁升清之職也。設泥不足爲虛。

則諸霍亂皆當補中氣爲治矣。于是益歎半癡開發經旨爲不誣。菊齋

此說與前釋邪之所湊其氣必虛之說可以互證。謝城

姜秋農瘧滿初痊。連勞奔走。陡患霍亂轉筋。面唇色紫。目陷音嘶。胸悶苦黃汗多。口膩神疲。洩脫脈細而絃。余以沙參鱉矢苡仁竹節半夏絲瓜絡木瓜車前子扁豆葉陰陽水煎。送左金丸一錢。外以吳萸一兩研末調塗涌泉穴。服後吐瀉漸止。噫氣不舒。呃忒脇疼。汗減口燥。腕下拒按。脈爽而絃。以素多肝鬱也。去沙參鱉矢木瓜車前左金加紫苑鬱金棟實通草枇杷葉二帖。洩行呃止。苔退足溫。腰腿疼。手紫漸淡。去鬱苑通棟加沙參。石斛蘭葉藕鮮稻露亦二帖。脈和服減。噫粥口鹹。體素陰虧也。去半夏扁豆葉加歸身花粉橘皮。又二帖。正解行而安。穀腰痠少寐。爲易西洋參加麥冬羊藿以調之。數帖後又加枸杞杜仲而愈。

此本虛標實之證。須看其先後用藥之法。琴仙

此證頗急。淺術必至張皇失措。半癡游刃有餘。治標而不犯其本。用藥與病機宛轉相赴。于此服其識之老。素問

仲韶弟主于葉氏。乙卯新秋陡患洞瀉如注。即渾身汗出如洗。慄慄一息。晝夜連余往勘。脈來沉細。身不發熱。儼似虛寒之證。惟苔色黃膩。小溲全無。乃溼熱病也。予桂苓甘露飲加厚朴投

七而瘳。

丙辰仲夏遊武林。仁和胡次瑤孝廉北上未歸。令正孫孺人陸患肢麻昏暈。以為急痧。速余視之。而微紅音低神憊。晴微赤。苔色微黃。足微冷。身微汗。胸微悶。脈微絛。乃本元素弱。謀慮繁思。心火上炎。內風隨以上僭。豈可誤作痧閉。妄投香散之藥哉。以人參龍礪菖連石莖麥冬小麥竹葉蓮子心為方。兩啜而瘳。導子平補善其後。次瑤醇謹博學。與余交最深。久欲卜居結鄰。而未果。庚申之變。率妻妾登舟。將來海昌。城閉不能出。與賊遇。併一幼女殉節于河。可哀也已。

霍亂醫案

主

寒蓋覆甚厚。詢其口不渴而瀉亦不熱。然小溲全無。吐者極苦。舌色甚赤。新涼外束。伏暑內發也。絳雪玉樞丹灌之。皆不受。瀉至四五次。始覺漸熱。而口大渴。仍不受飲。語言微蹇。余令搗生藕汁徐灌之。漸能受。隨以苓連芍藥梔蘇藜蘆公次煎服。痛即減。吐瀉亦止。改用輕清法而愈。

丁巳秋。三姪壽和甫六歲。陡患寒身熱。筋癰面紅。謔妄汗頻。四肢厥冷。苔色黃膩。口渴唇紅。時邪夾食也。以枳實梔鼓湯加菖蒲及冬乾蘆朮葉煎成。調入玉樞丹五分灌之。次日謔癰皆減。而腹痛吐瀉邪欲轉霍亂以外泄也。余嘗謂不但傷寒可轉霍亂而溫熱暑溼皆可轉霍亂也。治當迎刃而導之。于前方加

蘇葉一分黃連二分同炒煎服。連吐三五次。瀉六七次。痛即減。第三日神始爽慧。然去疾莫如盡。再服原方一劑遂愈。凡小兒之病因于食滯者多。胃不和則臥不安。陽明實則滯。若吐瀉乃病之出路。而世人動輒以驚風藥治之。每致債事。昧者更惑于巫瞽而祭非其鬼。尤可嗤也。余居浮溪七載。家人雖屢患大證。未嘗一用巫瞽。亦未傷人。鄉人目以為異。庚申秋。季傑之病甚危。壽萱姪求籤于觀音大凶。其妾欲事祈禱。余力止之。卒以治愈。附識之以戒我後人。

霍亂醫案

天

辛酉秋。余息漢院。盛行霍亂轉筋之證。一男子胸次拒按。余以蘆根子枳實檳榔等導之一婦袒胸不容蓋覆。猶云五內如焚。目陷音嘶。苔黃大渴而噉飲。即吐。肢厥脈伏。市醫令服薑湯一杯。幸不受。適余至。亟取冷雪水命將小匙徐灌之。遂不吐。更以石膏黃連知母瀉其逆衝之火。錢某證兼吐衄十餘條。而口乾脈細。是是伏厥陰以犯中也。以連梅鮮斛蘇藜清之。陳某所下皆血。苔黃大渴而舌色紫黯。乃暑毒深伏。起病時又飲燒酒也。用犀角益母地丁茅根菖蒲綠豆銀花苓連黃蘗藕汁大劑灌之。皆投匕而瘳。一婦積虛患此。汗出如浴。形脫聲嘶。脈微欲絕。為亡陽之候。予附子理中湯加白芍茯苓木瓜苡仁蠶砂而汗收脈起。隨去薑附加黃耆龍漸平。去蠶砂加橘半調補而安。劉氏婦患病已兩月不納穀矣。忍吐瀉轉筋。舌光聲啞。氣液

兩亡也。亟以人參炙甘草石脂餘糧龍牡斛芍木瓜烏梅冬蟲夏草爲方。服兩劑。音開脈續。諸證皆平。所親沈則甫按法調補而瘳矣。氏子患此。脈微弱。舌色淡紅。口微渴。此本虛邪不盛也。宜清解藥中加參以扶正氣。則甫亦如法施治而愈。時余體憊。畏熱憚煩。僅記大略如此。

今年三月閒。呂君慎庵言一童子。在鄰家嬉戲。陡然吐瀉轉筋。歸家卽斃。余以爲偶然有此一證耳。既而聞患此證者漸多。四月初有餘杭紙客在舟。次病此。抵濮乞余診。已舌卷囊縮。形脫神瀉。不可救藥矣。口開苔黑。詢中途並未服藥。竊謂此病之盛行。多在秋暑溼之時。何以今春卽爾。諦思其故。暑溼既可伏

霍亂醫案

元

至深秋而發爲霍亂。則冬傷于寒者。至春不爲溫病。亦可變爲霍亂也。雖爲溫病之變證。而溫卽熱也。故與伏暑爲病不甚懸殊。或曰此揣度當然耳。仲聖但有五苓理中治傷寒轉霍亂法。未有治溫病轉霍亂之法何耶。余謂古書傳兵火之餘。難免遺亡之憾。一隅三反在讀者之善悟焉。且細繹仲聖書。亦未嘗不畝露其意也。曰太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯。主之。張石頑注云。溫病始發。卽當用黃芩湯去熱爲主。若傷寒必傳至少陽。熱邪漸入裏。方可用黃芩佐柴胡解之。蓋黃芩湯乃溫病之主方。卽桂枝湯以黃芩易桂枝而去生薑。以桂枝主在表風寒。黃芩主在裏風熱。乃不易之定

法。其生薑辛散。非溫熱所宜。故去之。此表裏寒熱之不可不知者也。周禹載注云。明言太少二陽。何不用二經藥。非傷寒也。傷寒由表入裏。此則自內發外。無表。何以知太少二陽。或脇滿或頭痛。口苦引飲。或不惡寒而卽熱。故不得謂之表也。如傷寒合病皆表病也。今不但無表。且有利裏證。傷寒協熱利。必自傳經而入。不若此之卽利也。溫何以卽利。其人中氣本虛。內伏已深。不能盡泄于外。勢必下走利矣。按此論溫邪外發未久。卽可下走爲利。本文更有若嘔者。豈非溫病可轉霍亂。早運端倪于此乎。曩纂溫熱經緯于此條下。附註云。少陽膽木挾火。披猖嘔是上衝。利由下迫。何必中虛始利。飲聚而嘔。半夏生薑

霍亂醫案

三

專開飲結。如其熱熾。宜易連瀉。楊素剛先生評云。此註精當。非前人所及。今治溫病轉爲霍亂者。似當奉此以爲法也。慎庵聞之。極爲折服。再質宗匠。還望有以教我。

愚意此證。梔子似亦可用。輕者亦可不必黃連。未知是否。惟大藥太守必宜去之。謝城

五月初三日。余抵上洋。霍亂轉筋已流行成疫。主鎮海周君采山家不謁一客。藉以藏拙。且杜酬應之勞也。初八日。紹武近族移書家有南潯二客同患此證。一韓姓須臾而死。一紀運翔年十七。勢亦垂危。采山強拉余往視。曰。豈可見死而不救哉。然已手面皆黑。目陷睛竅厥逆音嘶。脈伏無溺。舌紫苔膩。大渴汗淋。

神情昏亂。危象畢呈。時未交芒種。暑溼之令未行。仍是冬寒內伏。春令過冷。入夏猶涼。氣機鬱遏。不宜。故欲變溫病者。皆轉爲此證。與伏暑爲患者殊塗同歸。但不腹痛耳。以寒邪化熱。究與暑溼較異也。亟令刺曲池。委中。出血如墨。方以黃芩爲君。臣以梔。鼓。連。芩。以半。佐以蘼。矢。蘆。根。絲。瓜。絡。少。加。吳。萸。爲。使。陰。陽。水。煎。候。溫。徐。服。之。遂。不。吐。次。日。脈。稍。起。又。兩。劑。黑。色。稍。淡。肘。膝。稍。和。反。加。晴。赤。煩。躁。是。伏。邪。將。從。外。泄。也。去。吳。萸。蘼。矢。加。連。翹。益。母。草。滑。石。而。斑。發。徧。身。苦。始。漸。化。肢。溫。得。寐。小。洩。亦。行。隨。與。清。搜。化。毒。之。藥。多。劑。而。痊。采。山。因。囑。余。詳。述。病。因。治。法。刊。印。傳。布。名。其。方。曰。黃。芩。定。亂。湯。嗣。治。多。人。悉。以。此。法。增。損。獲。效。如。利。

霍亂醫案

泰一洞庭史客。素吸洋煙而患此證。與此方數帖後。反便秘。目赤。渴汗昏狂。亦是久伏之邪。漸欲外越也。予竹葉石膏湯。加減而瘳。其溼盛者。加茵陳滑石。氣實者。加枳桔。飲阻食滯者。加厚朴蘆薈。肝鬱氣結者。加紫蘇棟實。口渴用茅根湯。或藕汁頻灌。活法在人。不能盡述。紹武在屠甸市。得余此方。勸人合藥。施送幾及千料云。

此方加減有法。較前尤妥善也。謝城

夏至後。仍無大熱。而霍亂轉筋不息。雖與芒種以前者同。爲伏邪所發。然證因略有不同。其病似較深一層。何也。按先曾祖重慶堂隨筆云。溫病熱病。溼溫病。治不得法。皆易致死。流行不已。

卽成疫癘。猶之治盜不得其法。則賊黨日衆。變爲流寇也。因熱氣病。氣屍氣。互相轉。卽成毒癘之氣。而爲疫。豈真天地之間。另有一種異氣哉。故疫之流行。必在人煙絳萃之區。蓋人氣最熱。紀文達公雜詩云。萬家煙火煖雲蒸。銷盡天山太古冰。自注烏魯木齊。自設郡縣以來。嬰兒出痘。與內地同。蓋彼處氣候極寒。今則漸同內地。人氣盛也。紀氏此言。可謂獨窺其微矣。上古無痘。至漢始有。今時罕有不出痘者。以生齒日繁。地氣日熱。所以古人最重傷寒。今世偏多溫熱也。雄按此段名言。括盡近世病情。治時證已無餘蘊矣。而于此日上海病。因尤爲切貼。地氣既日熱。穢氣亦日盛。加以疫氣屍氣。與內伏之邪。欲化熱病而不得者。卒然相觸。遂致濁不能降。清不能升。揮霍悶亂。而爲吐瀉轉筋之危證。是伏邪欲發。客邪外入。兩邪交攻。腸胃乃亂。故氣道立時閉塞。血脈因而瘀滯。四肢厥冷。手面皆黑。陽明多氣。多血之經。見證若是之驟者。非氣血忽然枯槁也。夫人氣以成形耳。氣不流行。血肉卽死。故初起亟宜開閉。俾氣通血活。邪得外泄。則正自復。昧者不知邪閉血凝。熱深厥深之理。見其肢冷。脈伏。卽以爲寒。又疑爲脫。既不敢刺。更投熱藥。使邪無宣泄。愈閉愈冷。尙謂服此熱藥。一身盡冷。可見黍谷春回之不易。再遇此證。仍用此法。死者之冤。無可呼籲。雖有七竅流血而死者。亦不悔悟。亦有邪閉則正氣無以自容。而外脫者。陽從上脫。則汗

霍亂醫案

三

多而氣奪。陰從下脫。則瀉多而液亡。所謂內閉外脫也。欲其不外脫。必開其內閉。如紫雪絳雪行軍散。皆開閉透伏之良方也。而飛龍奪命丹。卽合行軍絳雪二方而加峻者。且有人中白引濁下行。尤具斬關奪命之能。上虞陳君香谷聞之。慨爲製送。囑余詳敘方治刊布。因而救全不少。厥功偉哉。

自紀運翔之證。治愈後。凡患此者。紛紛踵門求診。情不能已。微幸成功者頗多。然夏至以後。病由內外合邪。其勢更劇。故必先以奪命丹開其閉伏。愈後變證不一。然隨機而應。甚費經營。非比往年之霍亂。雖係危證。但得轉機。卽可霍然也。故良由流離困苦。失志勞神。先有內傷。遂致曲折。故愈後調理。極宜詳慎。

霍亂醫案

霍

而上海多懋遷竄難之人。病得轉機。往往大意。所謂病加于小愈。因而致墮前功者不少。如餘杭褚子耘。茂才。余親家也。其使女患此。已身軀矣。適余往訪。知之。遂以香谷所贈奪命丹二分。囑其灌入。頃刻活動。隨予解毒活血湯數服。得生。嗣余往返崇明。聞其仍淹纏不健而亡。一王大生。烟鋪夥友。余治愈後。已溺行。能食。餘熱外泄。滿面赤瘰。忽然神氣瞽亂而死。一澧記錢鋪石某。余爲治愈。二便已如常矣。越數日。云飲食不得下。戴眼呃忒而逝。一綠蔭書坊陶姓。業已向愈。忽然神情恍忽。藥不及救。此麗雲爲余述者。又四明陳解香之弟。患此垂危。延余治愈。遂不服藥。月餘復來請勘。已咽痛礙進水穀。頤腫舌糜。牙關甚緊。

痰嗽脇疼。溺赤。骨痛。便澀色醬。此餘毒蘊隆。失于清解。遂致燎原。若此。是限于貧困。養癰成患。而脈已絃緊數疾。莫可措手。久之果斃。竝錄爲案。以爲買旅告。或云此地藥肆甚忙。每致誤付病者。誤服驟變。彼此不知。醫家病家。皆須留意。嗣閱冷廬醫話云。吾邑陳莊李氏子。患霍亂。醫定方有製半夏二錢。藥肆中誤以製附子與之。服後腹大痛發狂。口中流血而卒。李歸咎于醫。醫謂用藥不誤。必有他故。索視藥渣。則附子在焉。遂控于官。罰藥肆以金和息之。觀此。則或人之言尤信。然此案若病家良悞。隱忍而不言。醫者惶窘。走避而不辨。或藥渣棄無可證。則此獄雖咎陶莫斷矣。服藥可不慎哉。

霍亂醫案

霍

朱鳴岐患下利轉筋。醫見肢冷。卽投溫補。而服藥卽吐。既而呃忒不已。溫補加峻。病日以危。延至九朝。已萬無生理。備後事矣。子耘主其家。囑請余援。服至左絃滑。右弱不應。指苔黃厚而膩。渴小水不行。臍上拒按。因謂曰。病原不重。誤藥致劇。命不應死。幸而得吐。否則早爲泉下人也。予枳桔芩連。加夏蘇。翹蘆根。枇杷葉。滑石。開痰行食。舒結通陽。兩劑呃果止。而偏身赤斑。又兩劑燥矢下。而苔化溺行。右脈漸振。隨與清肅調養法而瘳。勘未證時。適子耘令弟子方茂才在座。曰。如此重證。君胡以爲病原不重也。余謂世間重證。大半因誤治而成。此證若初治得法。一二劑可愈也。奈舉世以瀉證吐證霍亂證霍亂轉。

筋證皆為寒證。往往不察病情。輒投熱藥。今見肢冷而右脈
更弱。彼方以為虛寒的據。孔服藥即吐。呃忒隨來。以霍亂轉
筋而見呃忒。何暇更問其餘。皇皇然以為虛脫之象。故溫補
日以加峻。縱使一蹶不起。病家無怨。醫者不悔也。每見此地
市醫臨證。雖極輕之病。必立重案。預為避罪邀功之地。授受
相承。伎倆如是。良可慨已。此外如胸腹疼痛。瘧疾哮喘。經阻
產後等證。世俗亦多指為寒病。雖以熱藥殺之。而彼此不知
者。而呃忒則尤多枉死焉。余嘗治一角妓。患呃累日。破身太
早。固是虛證。然血去陰傷。豈可反以溫燥助熱。遂致下焦不
攝。索性畏藥。余用一味雞子黃。連進數服而安。

霍亂醫案

霍

吳竹溪時感將瘧。患呃三日。聲聞于鄰。人皆危之。予通府行氣
法。便行痰吐而痊。南海朱君浦香。年五十六。自幼患重勞。繼以
吐血三十外。即絕欲。得延至此。而平素便如羊矢。其血分之虧
如是。今秋陡患呃忒。連服滋鎮溫納之藥。勢瀕于危。陸定圃進
士。囑延余診。脈至絳滑搏數。苔黃厚而膩。口苦溺赤。遂力排眾
議。主大劑涼潤。如雪蘂。棗仁。竹瀝。枇杷葉。蘆根。元參。紫苑。射干。
兜鈴。菖蒲等多劑。連下赤矢。始瘳。如此衰年虛體。尚因痰熱致
呃。故虛寒之呃。殊不多見。而醫者不知辨證。察脈。率以丁香。薑
桂為不祧之藥。何哉。
謝氏婦懷孕五月。便瀉四日。醫投薑附桂朴藥一帖。遂四肢麻

冷。氣塞神昏。溺閉汗淋。大渴嘔吐。急延余援。脈未全伏。先飲以
「油湯」。吐漸止。隨予參連。苓。槲。鉞。銀。花。扁。豆。葉。蒲。桃。乾。蘆。根。
綠。豆。以。冬。瓜。湯。煎。徐徐溫服。外用炭醋熏之。各恙皆差。次日脈
絳。滑。瀉。未。止。以。白。頭。翁。湯。加。參。草。銀。花。扁。豆。蒲。公。英。蒲。桃。乾。砂。
仁。兩劑而痊。
婺源詹耀堂。子年二十。患霍亂。服薑桂數劑。瀉不止。素吸亞片。
疑為虛漏。補之。瀉益甚。始延余視。大渴而脈絳數。幸而起病不
因暑熱。然陰分素虧。雖飲冷食涼。熱藥豈堪過劑。設無便瀉。以
分其藥力。則津液早枯矣。予白頭翁湯合封髓丹。加銀花綠豆。
石斛一劑。知二劑已。

霍亂醫案

霍

余赴申時。過石門。吳君仁山在濮陽。承其關切。曰。昆陵張仲遠
觀察。秀水楊嘯溪。孝廉。皆已自楚至申。句當公事。君可往訪也。
余感其意。唯唯而謝。緣久聞張氏家學淵源。雖閭閻皆通翰墨。
然向見其宛鄰書屋。醫書數種。似偏尚溫補者。曾與故人太倉
王子能參軍言之。子能亦善醫。歎曰。人之才識學力。各有能至。
不能至。不可強也。王半山不入相。即是伊川一流。秋壑鈴山能
甘恬退。不失為風雅之人。陽明先生勲業爛然。後人惜其多了。
講學一事。若張氏者。何必談醫。世人信其學問。而併信其醫。因
而貽誤者。實多。余弟季旭。仲遠之妹婿也。即為其所誤。噫。言猶
在耳。子能已下世十餘年矣。乃嘯溪為仲遠來索余書。余推故

不與嗣開仲遠之子患霍亂。徑投六君子湯一劑而亡。是泥于扶正卻邪之說。猶之寇來不戰。但知守城。卒以自斃耳。秋開仲遠亦亡。後蔣寅昉大理信來。深以余求書不與爲是。昔某侍郎督學吾浙。亦以上工自命。嘗浼邵位西樞部求書。余亦不與。所謂道不人談。免俗譏。備錄爲案。願世人毋輕言醫事。必量而後入也。

錢塘姚歐亭協轉復辛崇明。聞余在滬。新秋囑令弟發庵比部持函聘余往遊。以初夏偶患大瀉。後苦脾約。兩旬始一更衣。既而匝月一行。甚至月餘一行。極其艱滯。而先鞭後漕。汗出神憊。年踰六秩。步履蹇滯。雖廣服人乳及潤導諸藥。卒不效。開或納

霍亂醫案

卷

食如梗。嘔吐酸辣。六脈遲。更苦色白。潤不渴。小溲清。長腹無脹。痛此真中氣不足。洩便爲之變也。豈腸燥便秘可以潤藥濡之哉。既不宜潤。更不可下。以中虛開闔無權。恐一開而不復闔。將何如耶。亦不可升提。蓋吐酸食梗。已形下祕上衝之勢。又素吸洋煙。設一闔而竟不開。又將何如耶。爰以參朮橘半旋芍雞金木瓜枇杷葉爲方。服六劑。更衣兩次。解四彈丸。又三劑。解十五六丸。又三劑。下九丸。而始暢。並不堅燥。亦無溲矢。毫不怯力。是藥證已符。爲留調理法。而別設或吐酸食梗。則暫用參連橘半旋茹蘇葉枇杷葉紫石英以清肅鎮息之。八月初秋陽正烈。歐亭因公來申。久住舟中。從者皆病。况久虛初愈之體乎。初七日

忽然身熱。嘔瀉。哲嗣小歐別駕急逮余。勘白苔滿布。神憊不支。腹痛汗頻。音低溺澀。先予參連夏朴。節滑苡蘇。薑砂扁豆。葉二劑。熱退神清。而左脈仍絃。關上高。喉酸無寐。手足振惕。客邪雖解。土受木乘也。去滑朴。薑砂扁豆。葉。加伏神。蛤殼。紫菜。綠豆。白薏仁。三劑。苦化能眠。知饑瀉減。去薏仁。加菖蒲。白朮。五劑而痊。霍亂之開闔失常。中樞爲邪所亂也。此證之開闔無權。中虛不能主持也。一實一虛。正可互勘。至愈後之嘔瀉振惕。又爲風暑乘虛擾中之霍亂證。故詳列拙治。統貫通方。

霍亂醫案

卷

扇不停。已爲陽越之象。不敢與方。尋卽告殞。此憑證不憑脈也。次日董齋薦視朱君巽泉之尊人。年已六旬。患霍亂轉筋。證不甚劇。問答音清。而脈微欲絕。亦決其不治。已而果然。此憑脈不憑證也。汪金皆善醫。皆以余言爲不謬。踰半月。董齋于丙夜患此證。刺出黑血。侵曉連余往視。形脈兩脫。大汗如淋。目陷音嘶。溺無苦膩。平素嗜飲少穀。好善忘勞。暑淫蘊中。正氣潰散。勉投參藥。竟不能救。惜哉。因挽以一聯云。飄泊正無聊。感甘載神交。萍聚申江。將檢殘編。求品鑒。老終原是福。徑一朝仙去。風悽秋夜。那堪衰髮喪知音。

次女定宜年二十。體實耐勞。適同邑戴氏。初卽接女夫信云。女

于八月二十三日忽患痛瀉。肢冷脈伏。崔某進附子理中湯加減。瀉不止而苔黑唇燥。煩露熱象。改投犀斛生脈散等藥。形漸脫。又用附桂八味湯。遂于二十九日舌焦如炭而逝。彌留時語。謂曰。吾父在此病不至是也。噫。據此病情。是伏暑也。戴氏爲積德世醫家。余襲刻叢書十種。渠處皆有。竟使誤藥而亡。良可慘已。郵挽一聯云。垂老別兒行。祇因饒養無人。吾豈好遊。說不盡憂勤。惕厲底苦衷。指望異日歸來。或藉汝曹娛暮景。瀕危思父療。雖曰死生有命。爾如鑄錯。試徧了燥熱寒涼諸謬藥。回憶昔年鞠育。徒傾我淚。灑秋風。嗚呼。良朋愛女。同病同日而亡。斯重訂之役。尤不可已矣。並附輓言一以志交情。一以志藥誤也。

霍亂醫案

三

霜降前。水北族姪棋借。邀勘所親蔣君循庵之媳。患霍亂轉筋。交三日矣。厥逆口竅。膈悶無溺。苔黃苦渴。脈極絃細。屢進桂附。薑朮氣逆欲死。予呂陽瀉心湯加減。煎成徐服。外以吳萸研末。鹵調貼涌泉穴。服三劑。吐止足溫。去蘇朴加棟斛蒲公英多劑。始痊。蓋伏暑挾素盛之肝陽爲病。誤服溫補。以致違難廓清也。禾中方氏女二十六歲。播遷三載。秋仲抵申。患吐瀉。所親錢伯聲孝廉邀余視之一藥而痊。既而患腫。因在旅寄。竟不調治。交霜降。腫忽消不數日。又患霍亂。卽神氣瞀亂。屋中盤走。口呼姊姊。乃姊強納之臥。兩目旋轉不停。淚涔涔而滴。牙關卽緊。欲延余診。竟不及也。伯聲詢故。余曰。此流離困苦。憂鬱深沉。木土相

乘吐瀉而腫。節交霜降。氣肅腫消。鬱無所宣。直凌脾胃。吐瀉陡作。木火勃升。狂走目張。陽從上越。此情志內傷霍亂也。故告危如是之速。

南潯沈春泉。年五十七。立冬前五日食蟹羹後。陡患霍亂轉筋。所吐瀉者皆水。初進桂附藥。筋轉益甚。周身微汗。神倦嬾言。指漸冷。脈漸伏。時欲太息。更方用牡蠣一兩。龜版八錢。阿膠四錢。服後勢較劇。延余視之。苔黃大渴。小溲全無。瀉出極熱。心下拒按。伏暑挾食之證。不知何所見而予燥補溫膩之藥。乃病家謂其書畫甚優。故深信而不疑。竟以不起。可憐又可笑也。嗣問其次郎于立冬後亦患此證。醫知伏暑。用黃連等藥。吐瀉已止。因

霍亂醫案

四

脈未遽起。不知爲伏熱不清。改投附桂等三帖而亡。尤可哀已。上虞羅吉人。立冬前患霍亂轉筋。予知其陰分素虧。病由伏暑也。服藥已得轉機。數日後漸有呢忒。延余視之。脈絃數左甚。苔焦而渴。齟齬脫口。便溏色醬。小溲短赤。皆伏暑未清。氣機阻塞之象。既失清肅。乃當臍向帖。回陽膏。屢囑揭去而不從。後聞不起。此非敗證。余深惜之。

南潯張二梅。年踰六旬。秋間患霍亂轉筋。醫見高年而厥逆多汗。擬進溫補。張不敢服。但用平淡單方。及外治法而痊。然從此大便不堅。時時自汗。徧身瘡疥。畏熱異常。延至立冬後。邀余診之。脈甚滑數。口渴苔黃。便溏皆熱。猶著衾衣。是賦質偏陽。溼熱

內盛幸而畏進溫補得以引年與大劑清化法漸愈又今年患
赤者舉目皆是所謂偏地瘡疥洵非虛語外治之方甚多而不
善者罕效更有治不得法瘡驟愈而變證連隨其生者尋陷內
証也子耘傳一方頗佳以麻黃一兩川椒五錢蛇牀子五錢盤
螫七枚雄猪油或柏油熬透去渣另用明礬黃礬各一兩蓖麻
子大楓子各四十粒共研末調入油內絹包擦患處能拔毒
伏邪未出旬日可愈無後患此與火酒摩轉筋之義正同勿以
藥猛而訾之故附錄于此

無徵不信有法可師爰采羣書南鍼是仰然病情之幻伏
猶敵情之謫觚似是而非云非恰是千態萬狀莫可端倪
謬以身經附為夢影蓋時移事易境似炊梁而此燭擬槃
癡同捫筌或竹頭木屑亦大匠所需敢質通方毋嗤瑣陋
故列醫案第三

隨息居重訂霍亂論第四藥方篇

加昌王士雄夢隱纂

鎮海陳亨春泉校

藥性

原蠶砂 諸霍亂之主藥也。

黃芩 溫病轉霍亂之主藥。凡吐下而熱邪痞結上焦胸膈不
舒者並可與黃連半夏同用。

石膏 暑熱霍亂之主藥。凡吐利而苔黃人渴者並宜用之。外

扶風寒者佐以紫蘇桂枝香薷生薑之類。內挾痰滯者佐以厚

朴半夏苳蒲橘紅之類。下兼寒溼者佐以防己細辛海桐皮威

靈仙之類。

滑石 溼熱霍亂之主藥。熱甚者佐石膏。溼甚者佐茵陳。

薏苡仁 霍亂轉筋溺者之主藥也。

木瓜 霍亂轉筋溺不視者之主藥也。

香薷 夏令浴水逆風而霍亂之主藥也。

扁豆 中虛而暑溼霍亂之主藥也。

西洋人參 虛人霍亂之主藥也。

枳殼蘆薈子 停食霍亂之主藥也。

梔豉石菖蒲 穢濁霍亂之主藥也。

棟實黃檗桑葉絲瓜 霍亂而肝火盛者之主藥也。

茅根地丁益母蒲公英 霍亂而血分熱熾之主藥也。

竹茹石斛蘆根梔子枇杷葉 霍亂嘔噦之主藥也。

厚朴蘆根大腹皮 霍亂脹滿之主藥也。

茵陳連翹綠豆皮絲瓜絡 霍亂身黃之主藥也。

通草車前海金沙 霍亂無溺之主藥也。

綠豆銀花竹葉黃連 霍亂誤服熱藥之主藥也。

旋覆紫苑麥蘗蘆葦子 霍亂誤補之主藥也。

人參龍骨牡蠣甘草石脂餘糧 霍亂大虛欲脫之主藥也。

桂枝 傷寒轉霍亂之主藥也。

紫蘇霍香生薑厚朴白豆蔻 霍亂因外寒之主藥也。

霍亂藥方

吳茱萸烏藥砂仁高良薑 霍亂因內寒之主藥也。

人參白朮炙甘草蓮子 中虛而寒溼霍亂之主藥也。

丁香木香川椒神麴 瓜果魚蟹生冷傷中霍亂之主藥也。

乾薑附子肉桂硫黃 陽虛中寒而霍亂及寒霍亂誤服寒藥之主藥也。

方劑 附目次

臥龍丹 以下治熱證須預備者

立效丹

開關散

速效丹

甘露消毒丹

玉樞丹

紫金丹

行軍散

千金丹 即平安散

紫雪

碧雪

絳雪 即紅靈丹

飛龍奪命丹

煉雄丹

霍亂藥方

三聖丹 以下治寒證須預備者

蟾酥丸 四方

霍亂散

回陽膏

黃芩湯 以下各方治熱證

黃芩加半夏生薑湯

梔子豉湯

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

桂苓甘露飲

六一散

茵陳湯

四苓散

平胃散

正氣散

半夏厚朴湯

六和湯

香薷飲

黃連香薷飲

左金丸

黃芩定亂湯

燃照湯

連朴飲

蠶矢湯

解毒活血湯

駕輕湯

昌陽瀉心湯

麥門冬湯

致和湯

霍亂藥方

四

五苓散 以下各方治寒證

理中丸

厚朴生薑半夏甘草人參湯

四逆湯

通脈四逆加豬膽汁湯

附子杭米湯

吳茱萸湯

漿水散

冷香飲子

大順散

神香散

來復丹

桂枝湯

異功散

梅花丸

此下杜絕霍亂方

資生丸 二方

臥龍丹 治諸痧中惡霍亂五絕諸般卒倒急暴之證

西牛黃

飛金箔

各四分

梅花冰片

荆芥

辛薢

各二錢

香當門子

五錢

分六錢

豬牙皂角

一錢

燈心炭

五分

細查餅

密收

使氣

以少許搐鼻取嚏垂危重證亦可以

霍亂藥方

五

涼開水調灌分許併治痘瘡發背蛇蝎蜈蚣咬傷用酒塗患處。按羊躑躅俗名鬧羊花辛溫大毒不入湯劑入酒飲能殺人。近目即昏翳今肆中臥龍丹以此爲君藥。又去牛黃而加蟾酥減輕燈心炭而冰麝不過略用些須耳。故藥力大遜甚不可恃好善者必自配製也。

又

西黃六分梅片一分當門子各一錢北細辛一錢牙皂一錢羊躑躅各二錢燈心炭一兩七味製如上法主治亦同。

立效丹 治同上

砂仁三兩雄黃一兩蓬砂各一兩梅冰一兩當門子各九錢火硝六錢

霍亂藥方

藜蘆各三錢牛黃各三錢八味共研細瓷餅緊收勿令泄氣每用分許。盧管吹入鼻內若卒倒氣閉重證則七竅及臍中均可放。

置立蘇凡暑月入城市抹少許于鼻孔可杜穢惡諸氣。開闢散 治番痧臭毒痛如絞氣閉神昏欲絕之證。

燈心炭一兩羊躑躅三錢北細辛一錢杜蟾酥一錢牙皂各二錢牛黃一錢

每片當門子各一錢八味共研細瓷餅緊裝毋令泄氣每少許吹鼻得嚏即生。

速效丹 治諸痧手足麻木牙關緊急目閉不語胸背有紅點

或咽喉心痛及風餐露宿寒暑雜感危急之證

北細辛各三錢牙皂各三錢硃砂二錢廣木香五分陳皮一錢桔梗一錢

貫衆 薄荷葉 防風 製半夏 甘草各一錢枯礬五分白

芷一錢十三味共研細末瓷餅緊裝每用三分吹入鼻孔寒溼

內盛而病重者開水調服一錢方內蘇合香二錢尤妙按痧

藥方藥品珍貴者多推此價廉用以搗鼻頗亦有效故人徐

君亞枝嘗合大料交余在淳溪施送累年鄉人無不感頌。

甘露消毒丹天土治暑溼霍亂時感痧邪及觸冒穢惡不正之

氣身熱倦怠腹悶肢痠頭眩身黃口渴瘧痢淋濁泄瀉

瘡瘍水土不服諸病但看病人舌苔淡白或厚膩或乾黃者

疫邪尚在氣分悉以此丹主之凡醫臨證亦當準此化裁自

可十全爲上

霍亂藥方

飛滑石十五兩蘇茵陳十一兩淡黃芩十兩石菖蒲六兩川貝母六兩木

通各五兩霍香連翹射干薄荷葉白豆蔻各四兩十一

味不可加減生曬研細末瓷餅緊收每服三錢開水溫服

日二或以神麴糊丸彈子大調化服亦可此丹治溼溫時疫

著效亦神果年同人合其價廉功峻無出此方之右者一名

普濟解毒丹

太乙玉樞丹一名解毒治諸痧霍亂疫癘障氣喉風五絕尸疰

鬼胎驚悸顛狂百般惡證及諸中毒諸瘧疽水土不服黃疸

鼓脹蛇犬蟲傷內服外敷功難殫述洵神方也

山慈姑去皮洗淨川文蛤即五倍子千金子即續隨子去油

紅芽大戟一兩當門子錢五味先將慈蛤戟三味研極細末再入霜香研勻。梗米湯調和乾溼得宜。于辰日淨室中木臼內杵千餘下。每料分四十錠。故亦名紫金錠。再入飛淨硃砂飛淨明雄黃各五錢尤良。或以加味者杵成薄片。切而用之。名紫金片。每服一錢。涼開水調下。孕婦忌之。又不可與甘草藥同進也。

太乙紫金丹 治霍亂痧脹鼠障中惡水土不服喉風中毒蛇犬蟲傷五絕暴厥頭狂癰疽鬼疔魘魅及暑溼溫疫之邪瀾漫熏蒸神明昏亂危急諸證

山慈姑 川文蛤各二兩紅芽大戟 白檀香 安息香 蘇

霍亂藥方

八

合油各一兩千金霜一兩明雄黃飛琥珀各五錢梅冰 當門子各三錢十一味各研極細。再合研勻。濃梗米飲杵丸。綠豆大。外以飛金爲衣。每錢許涼開水下。按一瓢云。此方比蘇合丸而無熱。較至寶丹而不涼。兼玉樞丹之解毒。備二方之間。開洵爲濟生之仙品。立八百功之上藥也。又按昔人所云太乙丹能治多病者。卽上二方也。今俗傳太乙丹不知創自何人。藥品龐雜。羣集燥熱。惟風餐露宿。黎藿人寒。溼爲病者。服之頗宜。若一概施之。誤人匪淺。

行軍散 治霍亂痧脹山嵐瘴癘及暑熱穢惡諸邪直干包絡頭目昏暈不省人事危急等證。治口瘡喉痛點目去風熱。

障翳搐鼻辟時疫之氣

西牛黃 當門子 真珠 梅冰 蓬砂各一錢明雄黃飛淨

火硝三錢飛金二十錢八味各研極細如粉。再合研勻。查餅密收。

以蠟封之。每三五分涼開水調下。

千金丹一名人馬平安散治同上

明雄黃 蓬砂 硝石各一兩硃砂五錢梅冰 當門子各二錢飛

金一百錢七味各爲細末。合研勻。查餅緊裝。每二三分涼開水下。或嗅少許于鼻內。或加牛黃。洲溪云此秘方也。

紫雪 治痧脹穢毒心腹疔痛霍亂火熾躁發煩狂及暑火溫熱障疫毒厲諸邪直犯臆中猝死溫瘧發斑狂易叫走五尸

霍亂藥方

九

五疰鬼魅驚癇急黃蠱毒麻痘火閉口舌生瘡一切毒火邪火穿經入臟蘊伏深沉無醫可治之證

黃金百兩石頭十兩雲須金鋪中煉過葉子煮之方有性味而

研入寒水石石頭云如無真者慈石醋煨石膏白滑石各三

各五兩四石共搗碎用水一斛一斗連金煮至四斗五升去

滓入下藥

犀角屑羚羊角屑青木香沉香按研各五斤石頭止用五錢

丁香一兩石頭止用一錢元參切升麻各一斤石頭止用五錢

石頭止用一兩六錢甘草八錢洲溪用生者入八味入煎藥汁中煮取一斗五升石頭一

滓入下藥

朴硝十斤石頭用焰硝四斤石頭用三兩酒溪云二味入煎藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升石頭七投在水盆中半日欲凝入下藥

硃砂研細水飛淨三錢當門子研一兩二錢五分二味入煎藥中攪勻勿見火寒之二日候凝結成霜紫色鉛罐密收每服三四分至一錢量用新水調灌按雞峰方無慈石滑石硝石二角祇用各十兩丁沉香各五兩升麻六兩朴硝二斤麝香卻用三兩餘六味分兩同醫通云此方即千金元霜加甘草丁香硃砂三味遂易紫雪之名余以其香味易散故減小其制竊謂宜從張氏配合為是

霍亂藥方

碧雪 治熱極火閉痧脹昏狂及霍亂誤服熱藥煩躁昏亂及時疫憤亂便祕發斑一切積熱咽喉腫痛口糜眼爛舌瘡喉閉水漿不下等證

寒水石 石膏 硝石 朴硝 芒硝 牙硝 青黛 甘草 八味等分先將甘草煎湯去滓納諸藥再煎以柳木篦不住手攪令消鎔得所卻入青黛和勻傾入砂盆內候凝結成霜研細密收每錢許涼開水下上焦病以少許含化嚥津不能嚥物者蘆筒吹入喉中齒舌病抹患處

絳雪一名八寶 治霍亂痧脹肢厥脈伏轉筋昏暈障癘時疫暑毒下痢等證並治喉痺牙舌諸病湯火金刃諸傷均搽患處

硃砂 牙硝各一兩明雄黃飛蓬砂各六錢石炭四錢梅片當門子各三錢飛真金五錢八味擇吉日淨室中各研極細再研勻瓷餅緊收鎔蠟封口毋使泄氣每一分涼開水送下小兒減半以藥佩帶身上可辟疫氣牛馬羊瘟以此點其眼即愈飛龍奪命丹 治痧脹疔痛霍亂轉筋厥冷脈伏神昏危急之證及受溫暑障疫穢惡陰晦諸邪而眩暈痞脹昏亂狂或卒倒身強遺溺不語身熱瘧疾宛如中風或時證逆傳神迷狂謔小兒驚癇角弓反張牙關緊閉諸證

霍亂藥方

西牛黃二錢杜鰾酥火硝各一錢飛真金三百十六味各研極細合研勻瓷餅緊收毋令泄氣以少許吹鼻取嚏重者再用涼開水調服一分小兒減半按此丹芳香辟穢化毒祛邪宣氣通營全體大用真有斬關奪隘之功而具起死回生之力也

煉雄丹 治暑穢邪直犯包絡神明閉塞昏憤如尸及霍亂初定餘熱失清驟爾神昏如醉如寐身不厥冷脈至模糊者皆燥熱無形之氣蒙蔽膈中如人在煙塵障霧中行治失其宜漸漸燥悶而死此非牛黃清心犀角地黃等方可療此丹主之

極明雄黃分一研極細 提淨牙硝分六研細同入銅勺內。微火鎔化。攪勻。俟如水時。急瀝清者于碗內。粗渣不用。俟其凝定。收藏。此丹龍家秘制也。按此法見游宦紀聞。陳平伯載此方。黃多而硝少。素園糾其誤。謂黃多硝少。何能鎔化。今依楊定雄一硝六為率。

木通錢一通草錢三陳雨水按冬雪水 一碗煎出味。去滓。再以陳雨水九碗與藥汁和勻。每次用藥水一椀。磨入犀角三分。挑入煉雄三釐調勻。徐徐冷灌。能于三日內服盡十椀藥水。必有清痰吐出。數椀而愈。重者當親驗矣。

三聖丹 治寒淫為病諸痧腹痛霍亂吐瀉

木香一兩不明雄黃二明雄黃三共研細末以鮮荷葉橘葉霍香葉各二兩搗汁九綠豆大每服九分重者再服。

蟾酥丸 治暑月食涼飲冷食物不慎兼吸穢惡成痧脹腹痛或霍亂吐瀉

杜蟾酥化火酒 硃砂飛各明雄黃飛 茅山蒼朮土炒焦 丁香各一兩 牙皂各三錢 當門子錢一 七味各研極細。蟾酥打丸。鳳仙子大辰砂為衣。放舌底化下。重者二三丸。回溪云此祕方也。

又 治同上

杜蟾酥燒酒 明雄黃水飛各 丁香 木香 沉香各二錢 茅山蒼朮土炒焦 硃砂飛一錢 當門子錢一 西牛黃分三 九味各研極

細擇上吉日淨室中合研勻。同蟾酥加糯米糗尖五箇搗干。餘下丸如椒子大。曬乾盛于瓷碗內。再用硃砂一錢五分。燒酒調塗碗內。蓋好。用力搖一二千下。則光亮矣。密收瓷瓶內。每三粒輕者一粒。重者五粒。泉水下。

姚氏蟾酥丸 治同上

杜蟾酥大酒浸 詳如無杜 明雄黃 硃砂飛各 木香 電丁香 麝香飛各 當門子一兩 八味各研極細。和入蟾酥杵勻。丸黍米大。每藥丸就四兩。以火酒噴溼。蓋在碗內。加入飛淨硃砂六錢。竭力搖播。以光亮為度。

又一名通靈 治同上而力較峻

霍亂藥方

杜

霍亂藥方

杜

杜蟾酥九錢 燒 錦紋大黃六兩 硃砂飛 明雄黃飛 明天麻焙 麻黃去節 各錢 甘草二兩 丁香六錢 當門子三錢 茅朮水浸 切焙 十味各為細末。以糯米粥漿和杵丸。臘服子大。硃砂為衣。每七丸納舌下。少頃陰陽水下。若研細吹鼻。亦可取嚏。

霹靂散 治陽虛中寒腹痛吐瀉轉筋肢冷汗淋苔白不渴脈微欲絕者

附子濃甘草湯 吳茱萸泡去第一 次汁鹽 絲瓜絡燒酒洗 陳伏龍肝二兩 燒酒一木 瓜絡石 藤七錢 煎汁 丁香一兩 六味共為極細末。分作十九服。外以醋半酒 鹽五錢 藕肉一兩 煎滾。耳上灸存性。研每服加三釐。每病止須用半。以參湯下。按

確係寒證。此散固佳。若未辨陰陽。而用熱藥。以為外治。尚無大害。內服之藥。極宜審慎。勿輕試也。

回陽膏 治同上

生香附或用吳茱萸亦母丁香一兩上桂心八錢倭硫黃五錢門子錢四五味共研極細。瓷瓶密收。每二三分。安臍中。以膏藥封之一時。即愈。孕婦忌貼。按霍亂轉筋。既有寒暑之分。亦有寒暑雜感而成者。更有暑伏于內。而寒束于外者。故服藥最宜審慎。況利多亡陰。津液大奪。雖可投熱藥者。亦恐剛烈劫陰。終于不救。此方藥雖猛峻。而僅取其氣。由臍入腹。自能溫通臟腑。以逐寒邪。不致傷陰。誠為善策。惟口渴苔黃。下利極

霍亂藥方

十四

熱者。顯為陽證。雖見肢冷脈伏。亦勿妄貼此膏。更張其焰也。以上諸方。雖分別熱證寒證之治。而和平猛厲。用得宜。並皆佳妙。然非倉卒可辦者。故列諸前。冀仁人君子。量力製備。刊明藥味。證治。廣為傳播。俾醫家病家。一覽瞭然。不但將死者可以得生。而不死者亦不致誤藥。以喪其生。利濟之功。不其偉哉。方下兼及別證治例者。既不敢沒良方之大用。且以推廣施藥之仁懷也。

黃芩湯 傷寒論

治溫病變霍亂之主方。用者因證加減。

黃芩三兩炙甘草二兩芍藥各二兩大棗十二枚

水一斗。煮取三升。去渣。溫服一升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯 傷寒論

原方加半夏。升生薑。三兩。按冬傷于寒。至春發為溫病。有或利或嘔之兼證。皆少陽犯陽明也。故仲聖以黃芩清解溫邪。協芍藥泄迫血之熱。而以甘棗夏薑奠安中土。法至當矣。其溫病轉為霍亂。果由中虛飲聚而伏邪乘之者。仍宜以此法治之。如火勢披猖。上衝下迫。或脈數口渴。或熱深厥深。則無藉乎奠中滌飲。當從事于瀉火清中。舉一反三。在人善悟也。

梔子豉湯 傷寒論

治溫熱暑疫轉為霍亂之主劑。

梔子十四枚香豉四合

霍亂藥方

十五

水四升。先煮梔子。得二升半。內豉。煮取升半。去滓。分二服。按此傷寒吐劑也。然古方梔子生用。故能涌吐。今皆炒黑用之。雖不作吐。洵溪謂其滌熱除煩之性。故在也。而余之治熱霍亂。獨推以為主劑。蓋梔子苦寒。善泄鬱熱。故肘後方以之治乾霍亂矣。豉經蒸腐。性極和中。凡霍亂多由溼鬱化熱。挾穢濁惡氣。而擾攘于中宮。惟此二物。最為對證良藥。奈昔人皆不知察也。且二物之奇。匪可言罄。如偶以銀花竹葉清暑風。配以白蔻薤蒲宣穢惡。溼甚者。臣以滑朴。熱勝者。佐以芩連。同木瓜扁豆。則和中。合甘草鼠粘。而化毒。其有誤投熱藥。而致煩亂躁悶者。亦可藉以為解救。厥功懋矣。而古今之治

霍亂者從不引用。豈非一大闕典耶。

白虎湯 傷寒論 治暑熱熾盛而為霍亂者

石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 粳米六合

水一斗煮米熟湯成去滓溫服。升日三服按治霍亂。米須用陳倉者或用生苡仁亦妙。

白虎加人參湯 傷寒論 治證如前而元氣已虛者

原方加人參三兩

按白虎湯神于解熱。妙用無窮。加人參則補氣以生津。加桂枝則和營而化瘧。加蒼朮則清溼以治痼。變而為竹葉石膏湯。則為熱病後之補劑。余因推廣其義。凡暑熱霍亂之兼表

霍亂藥方

法

邪者。加香薷蘇葉之類。轉筋之熱極似寒。非反佐莫能深入。者少加細辛威靈仙之類。痰溼阻滯者。加厚朴半夏之類。血虛內熱者。加生地地丁之類。中虛氣弱者。加白朮苡仁之類。病衰而氣短精乏者。加大棗枸杞之類。無不奏效如神也。

竹葉石膏湯 傷寒論 治中虛暑熱霍亂及霍亂已定而餘熱未

清虛羸少氣者

竹葉二牛石膏一斤 半夏半升 人參三兩 麥門冬一升 粳米半升 甘草二兩

水

一斗先煮六味取六升去滓內杭米煮米熟湯成去米溫服一升日三按集驗云此方加生薑治嘔最良余謂治

霍亂宜用地漿煎更妙

桂苓甘露飲 河間 治暑熱熾盛之霍亂

桂去白朮 猪苓各五錢 茯苓去澤瀉各一兩 寒水石 石膏

甘草各二兩 一兩五錢 滑石兩四九味為末每三錢溫水或新汲

水或生薑湯量證調下小兒每服一錢按此方一名桂苓白朮散一方不用猪苓或云去猪苓加人參名桂苓白朮散

六一散 即益元散一名天水散

桂府膩白滑石六兩 甘草二兩 二味為末每三錢溫水或新汲

水調下日三按表邪者以茵白五寸豆豉五十粒煎湯調下

本方加黃丹名紅玉散加青黛名碧玉散加薄荷名雞蘇散

霍亂藥方

法

加硃砂名辰砂益元散

茵陳湯 肘後 治霍亂發斑

茵白一香鼓合

水煎入童子小便一合日三服

按石頭云本方藥味雖輕功效最著凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒靡不隨手獲效余謂胎前外感何嘗不是妙劑

盧根竹葉蘇葉黃芩可以隨證佐入

四苓散 溫疫論 治溼盛霍亂胸悶潮瀉而渴者

茯苓 猪苓 澤瀉 橘皮

水煎服

按吳氏五苓去桂而治胃中溼熱。最為有見。且以橘皮易朮。則無實中之弊。而有利氣之功。當變而變。斯為善用古法。欲平霍亂者。宜知所趨嚮矣。

平胃散 局方 治溼盛于中霍亂吐瀉

茅朮 去粗皮米 紫厚朴 去皮薑 陳皮 去白各三 甘草 炙二 四
味為末。每服二錢。水一盞。薑一片。煎七分。服。轉筋者加木瓜。本方加藿香半夏。名金不換正氣散。

藿香正氣散 治溼蘊于中寒襲其外而為霍亂吐瀉者

厚朴 陳皮 桔梗 白朮 半夏 各二 大腹皮 一本作蒼 朮或用水
可 亦白芷 茯苓 蘇葉 藿香 各三 甘草 炙一 十一味為

霍亂藥方

粗末。每三錢。薑三片。棗一枚。煎服。藿香散此方無。白朮似更妥。謝城。

按右二方皆治風寒外感。食滯內停。或兼溼邪。或吸穢氣。或傷生冷。或不服水土等證。的是良方。若溫暑熱證。不兼寒溼者。在所切禁。今人謂其統治四時感證。不審病情。一概濫用。殊可笑也。用治霍亂。甚東宜哉。

半夏厚朴湯 一名四七 治情志不舒痰溼阻氣而成霍亂者

半夏 厚朴 三 茯苓 兩 乾蘇葉 兩 生薑 五

水七升。煮取四升。分溫四服。

按此方既主七情不適之鬱痰證。亦治寒溼不化。風感外侵。食滯不消。誤投滋補。因而病劇者。無不所嚮輒捷。

六和湯 治夏月虛人外感風寒內傷生冷之霍亂吐瀉而身發熱者

香薷 二 人參 茯苓 甘草 炙 扁豆 厚朴 製 木瓜 杏仁
去皮 半夏 錢各一 藿香 砂仁 炒研 生薑 片 大棗 枚

水煎服

香薷飲 局方 治暑月乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹滿之霍亂

香薷 厚朴 薑汁 白扁豆 各半 三味為粗末。每五錢至一兩。水煎冷服。

黃連香薷飲 活人 治同上

霍亂藥方

原方加薑汁炒黃連四兩

左金丸 治霍亂轉筋肝火內熾或吐青綠苦水者

川連 六 吳茱萸 取陳而開 二味同煮乾為細末。米飲糊丸。綠豆大。每三錢。陳木瓜五錢煎湯下。吐酸味者。竹茹生苡仁各三錢煎湯下。按張雨農司馬見余采此方。極為首肯。云嘗在

都城見杜石樵少宰亦用此藥治愈多人也。

黃芩定亂湯 夢隱 治溫病轉為霍亂腹不痛而肢冷脈伏或肢

不冷而口渴苔黃小水不行神情煩躁

黃芩 酒 炒 焦 梔子 香豉 炒 各一 原蠶砂 錢 製 半夏 橘紅 水
炒 各 蒲公英 錢 鮮竹茹 錢 二 川連 薑汁 炒 陳吳萸 一分

陰陽水二錢煎一錢候溫徐服轉筋者加生苡仁八錢絲
瓜絡三錢潮行者用木瓜三錢淫盛者加連翹茵陳各三
錢

燃照湯霍亂論治暑穢挾溼霍亂吐下脫痞煩渴苔色白膩外
顯惡寒肢冷者

飛滑石四錢香豉炒三錢焦梔二錢黃芩炒酒省頭草各一錢製厚朴
製半夏各一錢

水煎去滓研入白蔻仁八分溫服苔膩而厚濁者去白蔻
加草果仁一錢煎服

連朴飲霍亂論治溼熱蘊伏而成霍亂兼能行食滌痰

霍亂藥方

二十

製厚朴二錢川連薑汁炒石菖蒲製半夏各一錢香豉炒焦梔各三錢蘆根二兩

水煎溫服

蠶矢湯霍亂論治霍亂轉筋肢冷腹痛口渴煩躁目陷脈伏時
行急證

晚蠶砂五錢生苡仁各四錢大豆黃卷各四錢陳木瓜三錢川連薑汁炒二錢
製半夏黃芩炒通草各一錢焦梔一錢陳吳萸三分

地漿或陰陽水煎稍涼徐服

解毒活血湯夢隱治溫暑痧邪深入營分轉筋吐下肢厥汗多
脈伏溺無口渴腹痛面黑目陷勢極可危之證

連翹絲瓜絡淡紫菜各三錢石菖蒲一錢川連吳萸水厚煎炒二錢
砂地丁益母草各五錢生苡仁八錢銀花四錢

地漿或陰陽水煎生綠豆四兩取清湯煎藥和入生藕汁
或白茅根汁或童便一杯稍涼徐徐服

駕輕湯霍亂論治霍亂後餘邪未清身熱口渴及餘熱內蘊身
冷脈沉湯藥不下而發呃者

鮮竹葉生扁豆各四錢香豉炒石斛各三錢枇杷葉剉二錢橘紅
鹽水陳木瓜各一錢焦梔一錢

水煎溫服

昌陽瀉心湯夢隱治霍亂後胸膈痞塞湯水礙下或渴或呃

霍亂藥方

五

石菖蒲黃芩炒製半夏各一錢川連薑汁炒蘇葉分三四製厚
朴八分鮮竹筍枇杷葉二錢蘆根兩

天雨水急火煎徐徐溫服小溲秘澀者加紫苑此方甚巧

按此瀉心湯證也何必另立方治以暑熱穢濁之邪與傷寒
不同故五瀉心皆有同枘方鑿之格漫為引用豈徒無益已

哉茲以菖蒲為君辛香不燥一名昌陽者謂能靖滌濁邪而
昌發清陽之氣也合諸藥以為劑共奏蠲痰泄熱展氣通津

之績已歷試不爽矣

麥門冬湯金匱治霍亂後餘熱未清神倦不饑無苔而渴或火
升氣逆乾咳無痰

麥冬一錢 兩製半夏五分 人參錢一 甘草錢六 杭米半 大棗四枚

水煎溫分四服

按海藏以竹葉易半夏治溫熱後房勞復之氣欲絕者大效。余謂即不因房勞復而氣液兩虧不能受重劑峻補皆可以此湯接續其一綫之生機余屢用輒效。

致和湯霍亂論 治霍亂後津液不復喉乾舌燥渴短便澀

北沙參 生扁豆 不斛 陳倉米各四錢 枇杷葉剉 鮮竹葉

麥冬各三錢 陳木瓜六分 生甘草一錢

水煎服

五苓散傷寒論 治傷寒轉霍亂身熱頭疼渴欲飲水

霍亂藥方

五

朮石頑云宜 茯苓 猪苓各十八銖 按二十四銖為一兩每

錢五分十八銖 澤瀉一兩 桂五錢 五味為末以白飲和服方寸

即七錢五分 七日三多飲煖水汗出愈

按仲聖于霍亂分列熱多寒多之治皆為傷寒轉為霍亂而設故二多字最宜玩味所云熱多者謂表熱多于裏寒也寒多者裏寒多于表熱也豈可以熱多二字遂謂此方可治熱霍亂哉沈果之云其用桂者宜陽氣通津液于周身非用之以通水道下出也用瀉朮二苓以通三焦之閉塞非開膀胱之溺竅也如果熱入而渴復用桂朮以溫液耗津又加苓澤以滲之是熱之又熱耗之又耗速之斃矣余謂觀此則多飲

煖水汗出愈之義益明故霍亂無陽氣鬱遏身熱之表證無

三焦閉塞氣化不宣之裏證而欲飲水者切勿誤解熱多為

熱證而妄援聖訓浪投此藥也石頑又可皆語焉未詳河間

則加三石以駕馭之茲復詳述方義庶用者知所取舍焉而

今人治霍熱病不察其有無外挾風寒內傷生冷之兼證輒

以胃苓湯為通用之方因而僨事者亦多且古方用散不過

三錢權量又小今世改為湯劑動輒一二兩權量又大宜乎

中病者恆少而誤人者恆多也豈獨霍亂然哉可慨也夫

又按此方與苓桂朮甘湯同為溫中滌飲之劑而力較峻凡

霍亂之寒溼內盛水飲阻閉三焦者雖外無風寒之表邪未

霍亂藥方

五

嘗不可用也故亦治水蓄之病溼聚之腫氣滯者加厚朴氣

虛者加人參名春 澤瀉名春 用藥如用兵苟能量敵而選將斯戰無不

克矣

理中丸傷寒論 治寒霍亂口不渴者

人參 甘草 白朮 乾薑各三錢 四味搗篩為末蜜和丸雞

黃大以沸湯數合和一丸碎研溫服之日三夜二腹中未熱

益至三四丸然不及湯湯法以味依兩數切用水八升煮取

三升去滓溫服一升日三

加減法若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩尤氏云臍上

築者臍上築然跳動腎氣上而之脾也脾方受氣朮之甘

能壅脾氣。故去之。桂之辛。能下腎氣。故加之。按此陽虛之腎氣動。欲作奔豚也。故去朮加桂。以杜其上凌之萌。若陰虛而臍上築。築者大忌。剛燥之劑。非峻滋肝腎之陰。不可。蓋一爲水動。一爲火動也。

吐多者。去朮加生薑三兩。尤氏云。吐多者。氣方上壅。甘能壅氣。故去朮。辛能散氣。故加生薑。按鄒潤安云。既吐且利。有屬太陰者。有屬少陰者。在少陰。則無用朮之理。在太陰。亦在可用可不用之列。以朮能治脾胃虛。不能治脾胃實。故吐多者去之。下多者。還用之。蓋朮能舉脾之陷。不能定胃之逆也。又洄溪云。寒霍亂可用理中者。百不得一。余謂是寒霍亂矣。可

霍亂藥方

霍

用理中矣。尙有如此細密加減之法。何今人不議病。又不議藥。輕于一試。何異以不教之民而使之戰耶。吁。可哀已。下多者。還用朮。悸者。加茯苓二兩。尤氏云。下多者。脾氣不守。故須朮以固之。悸者。腎水上逆。故加茯苓以導之。按今人治霍亂。既不辨其證之虛實寒熱。亦不察其吐多下多。溫補率投。漫無忌憚者。吾不知其何心也。渴欲得水者。加朮。足前成四兩半。尤氏云。渴欲得水者。津液不足。白朮之甘。足以生之。按此渴因脾虛。不能爲胃行其津液。故加朮以補脾。而致其津液也。所謂白朮能生津液者。其義如此。豈熱燥津液而渴者所堪一試哉。

腹中痛者。加人參。足前成四兩半。尤氏云。腹中痛者。裏虛不足。人參之甘。足以補之。按裏虛腹痛。必喜溫。按寒者加乾薑。足前成四兩半。尤氏云。寒者。腹中氣寒也。乾薑之辛。足以溫之。按五苓主熱多。謂表有熱也。理中主寒多。謂裏有寒也。故方下既有腹中未熱。益至三四丸之法。此復云寒者加乾薑。是腹中尙未熱。故獨于此味又加重也。蓋腹中寒。爲寒之真諦。故仲聖不嫌煩複。而瑣瑣教人。以此爲辨證之法。願昧者一見此。下腹寒。略不察其腹中光景。何如擅以薑附丁桂。欲其轉熱。遂至從此而一身皆冷。嗚呼。豈未聞熱深厥深之聖訓乎。

霍亂藥方

霍

腹滿者。去朮。加附子一枚。服湯後。如食頃。飲熱粥一升許。微自溫。勿發揭衣被。尤氏云。腹滿者。氣滯不行也。氣得甘則壅。得辛則行。故去朮加附子。按飲熱粥一升許。固是助藥力。亦是辨證法。設時行熱霍亂。不但熱粥在所大忌。即使不忌。亦固不能強飲升許。果能飲熱粥升許者。豈非虛寒爲病乎。故可以理中治之。若蔽于古而不知今。是房琯之以車戰也。按原方加附子。名附子理中湯。加青皮陳皮。名治中湯。加枳實茯苓。名枳實理中湯。加黃連。名連理湯。合五苓名理苓湯。厚朴生薑半夏甘草人參湯。治虛人寒溼霍亂。厚朴去皮生薑切各半夏洗半甘草炙二人參一

水一斗煮取三升去滓溫服一升日三

四逆湯傷寒論治陰寒霍亂汗出而四肢拘急小便復利脈微欲絕而無頭痛口渴者

生附子一枚乾薑兩半甘草炙二兩

水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可用大附子一枚乾薑三兩

按附子乾薑非攻蕩之品何以強人乃可如倍用蓋無論補瀉寒熱諸藥皆賴身中元氣載之以行敢氣強者堪任重劑若氣弱者投劑稍重則氣行愈餒焉能駕馭藥力以為補瀉寒熱之用耶凡事皆然用藥特其一端耳顧知之者鮮所以

覆敗多而成功少也

通脈四逆加豬膽汁湯傷寒論治陰寒霍亂愈後四肢拘急脈微欲絕者

前方加入豬膽汁半合和服如無豬膽以羊膽代之

附子杭米湯金匱治中寒霍亂肢冷腹痛吐少嘔多者

附子炮切半夏薑汁甘草炙各三錢大棗十枚杭米半升

水五升煮米熟湯成去滓溫服一升

吳茱萸湯傷寒論治少陰吐利厥逆煩躁及厥陰寒犯陽明食穀欲嘔

吳茱萸洗一斤人參三兩生薑六兩大棗十二枚

水七升煮取二升去滓分三服

漿水散潔古治陰寒霍亂暴瀉如水汗多身冷氣少腹痛脈沉或脫者

甘草乾薑附子桂各五錢良薑半夏俱醋炒

漿水煎去滓冷服

按石頑云漿水乃秫米和麴釀成如醋而淡今人點牛乳作餅川之或用澄綠豆粉之漿水尤佳余謂地漿亦可用冷香飲子治陰寒霍亂腹痛脈沉細或絃緊無汗惡寒面如塵土四肢厥逆陽氣大虛之證

甘草附子草果仁橘紅各一錢生薑片

水煎冷服

大順散局方治襲涼飲冷陰寒抑遏陽氣而成霍亂水穀不分脈沉而緊者

甘草四兩乾薑杏仁去皮桂心各六錢先將甘草同白砂

炒至八分黃熟王晉三云白次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁同炒候不作聲為度篩去砂與桂心同搗為散每二錢水煎服或沸湯調服如煩躁井華水調下

按洄溪云此治暑月內傷飲冷證非治暑也又甘草多于諸藥八倍亦非法此等病百不得一而世人竟以之治燥火之

暑病殺人無算可勝悼哉余謂以上三方皆治夏令因畏熱

而浴冷臥風。冰瓜過啖。反爲陰溼所傷致病。實夏月之傷寒也。故用藥如是。如名醫類案所載羅謙甫治商參政與元顏小將軍二案。俱用熱藥。俱不名曰暑病。又吳球治暑月遠行人案。直曰中寒。蓋深恐後世誤以熱藥治暑。故特舉病因以稱之。可謂名正言順矣。乃昧者猶誤謂此等方爲治暑之藥。誠有一盲引眾盲。相將入火坑之歎。夫盛夏之有寒病。猶隆冬之有熱病。雖不多見。而臨證者不可不諦辨而施治也。

神香散 景岳 治霍亂因于寒溼凝滯氣逆者

丁香 白豆蔻各七粒 二味研末，湯下小腹痛者加砂仁七粒。按晉三云此方治寒溼痧脹有神功，與益元散治溼熱痧脹。

可謂鍼鋒相對。

來復丹 局方 治上盛下虛裏寒外熱伏暑夾陰霍亂危證

太陰元精石 船上硫黃 硝石 各一兩用礬黃末
鐵火炒結成砂子大○桶紅

青皮去白五靈脂澄去砂炒令烟盡各二錢 六味爲末 醋糊丸 豌豆大每

服三十丸。白湯下。

柱枝湯 傷寒論 治寒霍亂後身痛不休

桂枝去芍藥 生薑切各三兩 甘草炙二兩 大棗十二枚

水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升須臾啜稀粥一升餘以助藥力。

異功散 治霍亂後中虛主劑

人參錢三錢 白朮炒黃一錢 茯苓錢半 甘草炙六分 橘紅

水煎服肝風動而身痛肢浮者加木瓜薑棗

梅花丸 治體虛多鬱。血熱氣愆。木土相乘。嘔瀉腹痛。易感痧穢。霍亂者。久服可杜外患。兼除宿恙。亦主肝胃久痛。消癥調經。帶催生種子。孕婦忌之。

綠萼白梅蕊三兩飛滑石七兩以粉丹皮入兩煎四製香附三兩
甘松 蓬莖述各五錢山藥 茯苓各三錢人參路參洋參高麗參皆可因

人酌用嫩黃耆 益智仁 砂仁勿見火遠志肉甘草水製木
香不見火一錢五分桔梗一錢五分甘草一錢五分五味各研細末合研勻煉白

蜜搗丸。每丸重一錢。白蠟置之。每一丸去脂。開水調服。

按此方調和氣血。舒鬱培元。男女皆堪久任。以杜諸疴。不僅可已肝胃之疼。而禦腸胃之亂也。孕婦體堅。或胎氣多滯者。正宜用以宣展充暢。惟虛而不固者忌之。

調和脾胃運化飲食滋養營衛消除百疾可杜霍亂

人參酌用白朮各三兩橘紅宜肉神麴各二兩茯苓一兩甘草五錢
同上兩薑汁各三錢九味研細末煉白蜜搗丸
錢五分川連五分白蔻仁五分

彈子大每食後細嚼一丸開水下嚴寒時或用淡薑湯下按石頑云此古方也與後人加味者雖繁簡不同而功效不

異

繆氏資生丸 治同上

人參人乳浸飯上蒸烘乾白朮米泔水浸山黃上掛蒸九次曬查肉蒸

橘紅略蒸各白茯苓細末水澄熱曬乾懷山藥切片白扁豆

炒湘蓮肉炒次實粉炒薏苡仁炒各一錢麥芽炒研磨取霍香

葉不見火甘草去皮桔梗米泔浸去蘆澤瀉切片白薏仁勿見

三錢川連次三錢十七味如法修事細末煉白蜜搗丸每

丸重二錢飯後白湯或橘皮湯砂仁湯嚥化下

按治法彙醫通蘭臺軌範載此方皆有神效二兩其餘分兩

亦稍有參差名醫方論有神效無澤瀉廣筆記云妊娠三月

霍亂藥方

五

陽明脈養胎陽明脈衰胎無所養故易墮也宜服此丸洄溪

云此方治懷孕氣阻用兼消補之法以止嘔吐而固胎氣意

頗可取余謂保胎止吐皆健運脾胃之功故曰資生夫脾胃

位鎮中樞而司出納為人生後天之本一失健運百病叢生

凡衰老稚弱及饑飽不時勞逸過度思慮久傷之輩脾胃尤

易受病若能常服此丸俾升降不愆周流無滯揮霍撥亂于

是斯焉

俱收並蓄待用無遺為將為醫理無二致對證發藥諺語
堪師十劑七方陣圖有法故必藥性明而兵法諳始可制
方臨敵也先藥性後方劑特其大略耳神明變化存乎其
人方先外治而後內服昭慎重也始臥龍而中結以致和
末殿以資生其有如臥龍之才者出而撥亂反正以致中
和則天地位萬物育化日舒長更何疫癘之有哉謹拭目
待之以慰余重訂此書之意焉故列藥方第四

霍亂藥方

五